

1. 茎灰白色、淡紫灰色至淡紫色。花序阔卵形或半球形。花浅蓝色。果实表面有白色而窄长的鳞片……
 2. 扁叶刺芹 *E. planum* L.

1. 刺芹 假芫荽、节节花、野香草(广东)、假香荽(广西)、缅甸芫荽、香菜(云南) 图版 28

Eryngium foetidum L. Sp. Pl. ed. 1. 232. 1753; de Boiss. in Bull. Herb. Boiss 3: 837. 1903; Dunn et Tutchet Fl. Kwangtung & Hongkong 116. 1912; Wolff in Engl. Pflanzenr. 61 (IV. 228): 203. 1913; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 140. 1927; Shan in Sinensia 7: 489. 1936.

二年生或多年生草本,高11—40厘米或超过,主根纺锤形。茎绿色直立,粗壮,无毛,有数条槽纹,上部有3—5歧聚伞式的分枝。基生叶披针形或倒披针形不分裂,革质,长5—25厘米,宽1.2—4厘米,顶端钝,基部渐窄有膜质叶鞘,边缘有骨质尖锐锯齿,近基部的锯齿狭窄呈刚毛状,表面深绿色,背面淡绿色,两面无毛,羽状网脉;叶柄短,基部有鞘可达3厘米;茎生叶着生在每一叉状分枝的基部,对生,无柄,边缘有深锯齿,齿尖刺状,顶端不分裂或3—5深裂。头状花序生于茎的分叉处及上部枝条的短枝上,呈圆柱形,长0.5—1.2厘米,宽3—5毫米,无花序梗;总苞片4—7,长1.5—3.5厘米,宽4—10毫米,叶状,披针形,边缘有1—3刺状锯齿;小总苞片阔线形至披针形,长1.5—1.8毫米,宽约0.6毫米,边缘透明膜质;萼齿卵状披针形至卵状三角形,长0.5—1毫米,顶端尖锐;花瓣与萼齿近等长,倒披针形至倒卵形,顶端内折,白色、淡黄色或草绿色;花丝长约1.4毫米;花柱直立或稍向外倾斜,长约1.1毫米,略长过萼齿。果卵圆形或球形,长1.1—1.3毫米,宽1.2—1.3毫米,表面有瘤状凸起,果棱不明显。 花果期4—12月。


产于广东、广西、贵州、云南等省区。通常生长在海拔100—1540米的丘陵、山地林下、路旁、沟边等湿润处。南美东部、中美、安的列斯群岛以至亚洲、非洲的热带地区也有分布。

本植物在南美及其它热带地方,用于利尿、治水肿病与蛇咬伤有良效,又可作食用香料,气味同芫荽。

2. 扁叶刺芹(拟)图版 29

Eryngium planum L. Sp. Pl. ed. 1: 233. 1753; Wolff in Engl. Pflanzenr. 61 (IV. 228): 127. 1913; Hegi Ill. Fl. von Mitt. Europ. 5 (2): 983. 1926.

多年生直立草本,高约75厘米。根粗厚,圆柱形,通常不分枝,表皮棕褐色。茎灰白色、淡紫灰色至深紫色,单生,坚硬,光滑,上部3歧式1—4回叉状分枝,基部常残留枯死的叶或成纤维状。基生叶长椭圆状卵形,长5—8.5厘米,宽2.5—5厘米,边缘有粗锯齿,齿端刺尖,基部心形至深心形,表面绿色,背面淡绿色,无毛,叶脉7—9条,掌状,两面隆起;叶柄长6—11.5厘米;茎下部叶有短柄,与基生叶同形或有分裂,茎上部叶无柄,浅裂



图版 28 刺芹 *Eryngium foetidum* L.

1. 植株； 2. 花序与总苞； 3. 小苞片； 4. 花瓣； 5. 雄蕊； 6. 花； 7. 果实。（史渭清绘）