

Franch. var. *ambrosiifolium* Franch. in Bull. Philom. Paris 8(6): 125. 1894.
——*Pimpinella scaberula* (Franch.) Wolff var. *ambrosiifolia* (Franch.) Wolff
in Engl. Pflanzenr. 90 (IV. 228): 274. 1927.

本变种与原变种的主要区别在于全株密生柔毛,较下部的茎生叶柄短,最末的裂片边缘近羽状深裂至缺刻状深锯齿。花期8—9月。

产四川、云南。生于海拔3000米的山坡草地上。模式标本采自云南宾川大龙潭。

2. 马尔康糙果芹 图版 4:5—8

Trachyspermum triradiatum Wolff in Acta Hort. Gothob. 2: 305. 1926.

多年生草本,全体有毛。主根细长,圆锥形。茎多分枝,开展,有细条纹。基生叶柄长1.5—4厘米,叶鞘短,抱茎;叶片羽状分裂,羽片3—5,呈卵形或倒卵形,长8—15毫米,宽5—12毫米,基部楔形,先端3裂至中部,裂片边缘有少数钝齿;较上部的茎生叶通常3裂,裂片线形,全缘或有1—2齿。复伞形花序顶生或与叶成对生,花序梗长1—5厘米,无总苞片和小总苞片;伞辐通常2—4,长5—13毫米;小伞形花序有花3—7;萼齿退化;花瓣近倒卵圆形,长、宽约1毫米,背面有毛,顶端有内折的小舌片;花柱基短,在果期呈圆锥形,花柱直立或向外反折。果实阔卵形,长约2毫米,先端窄、两侧扁压,表面密生向上弯曲的白糙毛,分生果横剖面近五角形,每棱槽内有油管3,合生面油管2—4;胚乳腹面平直。花期8月,果期9月。

产四川。生于海拔2530—3100米的山坡路旁。模式标本采自四川马尔康卓克基。


38. 絨果芹屬 滇羌活屬(中国种子植物科属辞典)——*Eriocycla* Lindl.

Lindl. in Royl. Illustr. Bot. Himal. Mount. 232. 1835; Wolff
in Engl. Pflanzenr. 90 (IV. 228): 105. 1927.——*Pituranthus*
Viv. subgen. *Eriocycla* (Lindl.) C. B. Clarke in Hook. f. Fl.
Brit. Ind. 2: 680. 1879.

多年生草本,全株被柔毛或光滑。茎基部多木质化,常有分枝。叶基生和茎生,1—2回羽状分裂,裂片线形至卵形。复伞形花序顶生和侧生,总苞片有或无,伞辐2—10,不等长;小伞形花序有线形的小苞片;萼齿小或不明显;花瓣白色或黄色,稀紫色,卵形或阔倒卵形,顶端内折;子房密被柔毛,花柱基扁压或为短圆锥状,花盘边缘波状,花柱长,近直立或反卷。分生果卵状长圆形至椭圆形,密被柔毛,果棱细或不明显,每棱槽内有油管1,合生面油管2,胚乳腹面平直或稍凹入。

本属约8种,分布于伊朗北部至中国西部的温带和高山区。我国有3种,2变种,产新疆、西藏、内蒙古、辽 和河北等省区。

本属模式种:裸茎絨果芹 *Eriocycla nuda* Lindl. 产喜马拉雅山区西北部 Kuna-war.



1-4. 糙果芹 *Trachyspermum scaberulum* (Fr.) H. Wolff ex Hand.-Mazz.: 1. 部分植株, 2. 花, 3. 花瓣, 4. 果实。5-8. 马尔康糙果芹 *Trachyspermum triradiatum* Wolff: 5. 部分果序, 6. 花, 7. 花瓣, 8. 果实。(史渭清绘)