

9 月。

产云南西北部和西藏。生于高山草地或灌丛中。模式标本采自云南宾川鸡山（鸡足山）。

本种与钝瓣小芹 *S. cruciatum* (Franch.) Wolff 相近,但基生叶与茎生叶的末回裂片线形伸长,长 1—2.5 厘米,宽 0.5—1 毫米;伞辐较多, 10—12, 花瓣白色, 顶端短尖, 不同于后者。

5. 蕨叶小芹 图版 12: 5—9

Sinocarum filicinum Wolff in Fedde, Repert. Sp. Nov. 27: 182. 1929.

植株细柔,高 15—30 厘米。根胡萝卜状,长 2—7 厘米,径 0.5—1 厘米。茎单生或 2—3 个,不分枝或 1—3 个分枝,微被柔毛。基生叶 2—4,有柄,柄基部有膨大的叶鞘,呈卵圆形或长卵形,叶柄包括鞘长 2—5 厘米,有白色柔毛;叶片轮廓呈三角形,长 3—5 厘米,宽 2—4 厘米,2 回羽状分裂,第 1 回羽片 3—4 对,下面的一对有短柄,其余无柄,末回裂片长卵形,边缘有齿,叶轴及裂片背面有白色柔毛;茎中下部的叶片与基生叶同形,向上渐小,1 回羽状分裂。复伞形花序有总苞片 1—4,线状披针形;小伞形花序有花 10—15,白色;萼齿细小;花瓣卵形至阔倒卵形,基部有爪,顶端钝圆或微凹;花柱基圆锥形,花柱与花柱基近等长,向两侧弯曲。果实卵形至长卵形;胚乳腹面平直。 花果期 6—9 月。

产云南西北部和西藏东南部。生于海拔 2500—4500 米的高山草甸中或岩石上。模式标本采自云南大理。

本种与钝瓣小芹 *S. cruciatum* (Franch.) Wolff 相近,萼齿细小;花瓣全缘不分裂。但本种的叶片为 2 回羽状分裂,末回裂片长卵形,边缘有齿,叶轴及裂片背面有明显的白色柔毛,有总苞片及小总苞片,这些特点与后者不同。


6. 少辐小芹 图版 10: 5—8

Sinocarum pauciradiatum Shan et Pu, 植物分类学报 18 (3): 374. 1980.

细小草本,高 3—5 厘米。根圆锥形,长 0.5—1 厘米。茎单生或 2 个,紫红色,有棱;不分枝或偶有 1 个分枝。基生叶 3—4,有柄,叶鞘紫色,叶柄包括鞘长 1—1.5 厘米;叶片轮廓三角形,长 4—7 毫米,基部宽 5—6 毫米,1—2 回羽状分裂,羽片 2—3 对,末回裂片长卵形至披针形,长 1—1.5 毫米,宽 0.5—1 毫米;茎生叶 1—2,较小,无柄,叶鞘紫色,叶片 1 回羽状分裂。复伞形花序无总苞或偶有 1 片,线状披针形;伞辐 2—3;小伞形花序有花 3—10;花瓣长约 5 毫米,紫色,卵形,阔倒卵形,基部有短爪,顶端急尖,不反折,全缘;花柱基垫状,花柱短。幼果卵形。

产四川西南部和西藏南部。生于海拔 3200—4500 米的高山草甸或石缝中。模式标本采自西藏错那。

本种与紫茎小芹 *S. coloratum* (Diels) Wolff 相近,但本种植株细小,仅高 4—5 厘米,花序小,伞辐少,仅 2—3 条,花 3—10 朵,花瓣不分裂。



1—4. 紫茎小芹 *Sinocarum coloratum* (Diels) Wolff: 1. 植株, 2. 花, 3. 花瓣, 4. 果实。5—8. 少
辐小芹 *Sinocarum pauciradiatum* Shan et Pu: 5. 植株, 6. 花, 7. 花瓣, 8. 果实。(史渭清绘)