

头状。分生果椭圆形或卵形，背面稍扁压，果棱翅状突起；每棱槽内油管 1，粗大，合生面油管 2；分生果横剖面近五角形。

单种属，分布于苏联中亚地区；我国仅产新疆。

本属模式种：西归芹 *Seselopsis tianschanicum* Schischk.

1. 西归芹 土当归(新疆)、天山邪蒿(高等植物图鉴) 图版 58

Seselopsis tianschanicum Schischk. in Bot. Mat. Herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS 13: 159. 1950 et in Komarov, Fl. URSS 16: 415. 1950; Korov. in Pavlov, Fl. Kazakh. 6: 308. 1963.

多年生草本，高 40—90 厘米。根增粗成纺锤状。茎单一，基部粗 4—6 毫米，下部带紫色，中空，表面有纵细条纹，无毛，从中部或中下部往上分枝。基生叶早枯萎；茎下部叶有长柄，叶柄基部扩展成披针形叶鞘；叶片轮廓卵形，2—3 回三出羽状全裂，一回羽片 3 对，有柄，末回裂片披针状线形，长 2—9 厘米，宽 1—5 毫米，无毛；茎上部叶较小，叶片 1 回羽状全裂，裂片较短，披针状线形，无柄，着生在披针形的叶鞘上。复伞形花序顶生和侧生，直径 5—9 厘米，伞辐 6—18，不等长，有棱，内侧粗糙或有白色短毛；无总苞片；小伞形花序多花，花柄不等长；小总苞片窄线形，多数，不等长，反折；花瓣白色或淡紫红色，外面的一瓣稍长。分生果卵形或椭圆形，长 3—4 毫米，宽 2 毫米，果棱翅状突起，侧棱较宽；每棱槽内油管 1，粗大，合生面油管 2。花期 7 月，果期 8 月。

产我国新疆。生于天山山区，海拔 1500—2500 米的草原灌丛中和草坡上。苏联中亚地区也有分布。

根药用，治跌打损伤、贫血等症。

50. 斑膜芹属——*Hymenolyma* Korov.

Korov. in Bot. Mat. Herb. Inst. Bot. et Zool. Ac. Soc. Uzbekist. 12: 30. 1948.

多年生一次结果的草本。具块根。基生叶有长柄，基部有宽阔叶鞘；叶片轮廓卵形或长圆形，3 回羽状全裂，末回裂片线形或披针状线形。复伞形花序有总苞片和小总苞片各 5，薄膜质；伞辐不等长；小伞形花序有花 6—15；无萼齿或萼齿不显著；花瓣白色，倒卵形，顶端微凹，有内折的小舌片；花柱基圆锥状，花柱短，叉开或弯曲。分生果长圆形或长圆状椭圆形，背腹略扁压，有宽阔的合生面，外果皮紧贴，果棱丝状突起；每棱槽内油管 1—4，合生面油管 2—10；心皮柄 2 深裂至基部。

本属有 2 种，分布在苏联中亚地区，我国新疆有产。

本属模式种：斑膜芹 *Hymenolyma trichophyllum* (Schrenk) Korov.

斑膜芹属分种检索表

1. 块根纺锤状;茎下部叶片轮廓卵形;小总苞片长圆形,初花期短于花柄 1. 斑膜芹 *H. trichophyllum* (Schrenk) Korov.
 1. 块根胡萝卜状;茎下部叶片轮廓长圆形;小总苞片倒卵形或椭圆形,有5—8条紫红色脉,初花期长于花柄 2. 柴胡状斑膜芹 *H. bupleuroides* (Schrenk) Korov.

1. 斑膜芹 图版 59:1—6

Hymenolyma trichophyllum (Schrenk) Korov. in Bot. Mat. Herb. Inst. Bot. et Zool. Ac. Soc. Uzbekist. 12: 31. 1948; Schischk. in Komarov, Fl. URSS 16: 413. 1950; Korov. in Pavlov, Fl. Kazakh. 6: 318. 1963. — *Carum bupleuroides* Schrenk in Bull. Phys.-Math. Acad. Petersb. 3: 305. 1845.

多年生草本,高30—70厘米,全株光滑或近光滑。块根纺锤状或长圆状,灰褐色,长2—5厘米,径1—2厘米,根颈上残存枯鞘纤维。茎单一,稀2,径2—4毫米,从中部以上分枝,呈伞房状。基生叶早枯萎,有叶柄,叶柄长2.5—4厘米,基部增宽成鞘;叶片轮廓卵形,长6—7厘米,宽3—4厘米,3回羽状全裂,1回羽片长圆形,无柄,末回裂片丝状或窄线形,长3—5毫米,宽0.2毫米,锐尖,顶端有小尖头;茎上部叶无柄,着生在鞘上,叶片分裂次数减少,末回裂片长2—3厘米。复伞形花序顶生和侧生,直径1.5—3.5厘米;伞辐8—15,不等长;总苞片5,长圆形,顶端钝,边缘宽膜质,短于伞辐;小伞形花序有花8—15,花柄不等长;小总苞片5,椭圆形,几乎完全膜质,黄白色,有3条明显脉纹,初花时短于花柄;无萼齿;花瓣白色,广卵形,顶端微凹,内折,长约1毫米;花柱基圆锥形。分生果长1—3毫米,宽1—1.5毫米,褐色,果棱明显,丝状突起;每棱槽内油管1,合生面油管2。花期6月,果期7月。

产我国新疆。生于半荒漠中和砾石质山坡上。苏联中亚地区也有分布。

2. 柴胡状斑膜芹 图版 59:7—9

Hymenolyma bupleuroides (Schrenk) Korov. in Bot. Mat. Herb. Inst. Bot. et Zool. Ac. Soc. Uzbekist. 12: 31. 1948; Schischk. in Komarov, Fl. URSS 16: 414. 1950; Korov. in Pavlov, Fl. Kazakh. 6: 318. 1963.

多年生草本,高40—70厘米。根胡萝卜状增粗,根颈上残存有枯鞘纤维。茎单一,上部稍有分枝,略呈伞房状,光滑无毛。基生叶早枯萎,有叶柄,长5—10厘米,基部扩展成鞘;叶片轮廓长圆形,长8—15厘米,宽1.5—3厘米,3回羽状全裂,末回裂片披针状线形,锐尖,光滑或粗糙,长2—3毫米,宽约1毫米;茎上部叶较小,叶的末回裂片线形,长1—4厘米,有短鞘。复伞形花序顶生和侧生,直径2—4厘米;伞辐10—15,无毛,不等长;总苞片5,椭圆形,边缘宽膜质;小伞形花序有花10—15,花柄不等长;小总苞片倒卵形或椭圆形,几乎全部膜质,有5—8条紫红色脉纹,初花时长于花柄;无萼齿;花瓣白色,