

面油管 2。花期 8—9 月, 果期 9 月。

产我国西藏。生于山谷云杉林下及村旁水边, 海拔 3200 米。模式标本采自西藏米林。

2b. 少裂西藏白苞芹 (植物分类学报) 图版 61: 7—8

Nothosmyrnum xizangense Shan et T. S. Wang var. *simpliciorum* Shan et T. S. Wang, 植物分类学报 18(3): 376. 1980.

本变种与原变种的不同在于叶 1—2 回羽状分裂; 伞辐 8—13; 分生果每棱槽中有油管 2, 合生面油管 4。

产我国西藏。生于山坡林间草地及河滩上, 海拔 3100—3400 米。模式标本采自西藏米林。

52. 山茴香属——*Carlesia* Dunn

Dunn in Hook. Icon. Pl. 28: 2739. 1905.

矮小, 多年生草本。根粗厚, 圆锥形。茎直立, 有分枝。基生叶多数, 宿存, 3 回羽状全裂, 末回裂片线形, 先端尖, 边缘略内卷; 叶柄基部有叶鞘; 茎生叶 2—3 回羽状全裂, 裂片线形。复伞形花序顶生与腋生; 总苞片数枚, 线形, 小总苞片钻形至线形; 伞辐多数, 略开展; 花白色, 有短柄; 萼齿明显, 卵状三角形; 花瓣倒卵形, 基部渐狭, 先端长而内折; 雄蕊长于花瓣; 花柱基隆起, 圆锥形, 花柱在花后与果实近等长。果实长倒卵形或长椭圆状卵形, 表面被短糙毛, 主棱钝; 每棱槽内油管 3, 胚乳腹面平直。

本属 1 种, 产我国东北部。

本属模式种: 山茴香 *Carlesia sinensis* Dunn

1. 山茴香 岩茴香(山东) 图版 62

Carlesia sinensis Dunn in Hook. Icon. Pl. 28: 2739. 1905; 中国高等植物图鉴 2: 1077. 图 3883. 1972.

矮小草本, 高 10—30 厘米。根圆锥形, 径 8—15 毫米, 根颈常残留纤维状的叶鞘。茎直立, 光滑, 有分枝, 径约 2 毫米。基生叶的叶柄长 2.5—8.5 厘米, 基部有鞘; 叶片轮廓呈长卵形至长圆形, 长 2.5—7 厘米, 宽 1—3.5 厘米, 通常 3 回羽状全裂, 第 1 回的裂片具短柄, 末回裂片线形, 长 4—10 毫米, 宽约 1 毫米, 先端尖, 全缘, 边缘略内卷, 两面无毛; 中部的茎生叶有短柄, 叶片 2—3 回羽状全裂, 裂片线形; 最上部的茎生叶细小, 3 深裂。复伞形花序顶生或腋生, 花序梗长 1.5—8 厘米; 总苞片线形, 长 5—8 毫米, 宽约 1 毫米; 伞辐 7—12(—20), 长 1—3 厘米; 小总苞片钻形至线形, 长 2—5 毫米; 花白色, 花柄长 2—3 毫米; 萼齿卵状三角形, 长 0.6—1 毫米, 宽 0.2—0.5 毫米, 外面有毛; 花瓣倒卵形, 长 1.2—1.5 毫米, 宽 1—1.2 毫米, 下部渐窄, 先端微缺, 有内折的小舌片, 中脉 1 条; 花丝长于花瓣, 花药卵圆形; 花柱基圆锥形, 花柱在开花后长约 2 毫米。果实长倒卵形至长椭圆状卵形, 表