

.....组 5. 拟光叶芹组 Sect. *Pseudosilaus* Schischk.

16. 锐齿西风芹 *S. inciso-dentatum* K. T. Fu

组 1. 西风芹组——Sect. *Seseli*——Sect. *Euseseli* DC. Coll. Mem. 5: 47. 1828. emend. Calestani in Webbia 1: 199. 1905; Schischk. in Komarov, Fl. URSS 16: 489. 1950. —Sect. *Hippomarathroides* DC. 1. c. incl.

具细小三角形萼齿，宿存；花瓣白色或绿色，外部无毛或有柔毛；果实有粗棱，无毛或有柔毛，每棱槽内油管 1，合生面油管 2。

本组我国产 7 种。

1. 膜盘西风芹 图版 73: 1—7

Seseli glabratum Willd. ex Schult. Syst. 6: 406 1820; Schischk. in Komarov, Fl. URSS 16: 496. 1950; Korov. in Pavlov, Fl. Kazakh. 6: 357. 1963. —*S. tenuifolium* Ledeb. Fl. Alt. 1: 333. 1829; Ledeb. Fl. Ross. 2: 274. 1844; Pavlov, Fl. Centr. Kazakh. 2: 522. 1935.


多年生草本，高 25—50 厘米。根圆锥形，皮灰褐色，木质化；根颈多分枝结成拳指状，每分枝上丛生茎叶。茎多数，圆柱形，基部径 1.5—3 毫米，细而硬挺，有不明显的细条纹，光滑无毛，分枝多曲折。基生叶多数丛生状，叶柄长 4—6 厘米，有浅纵沟槽，基部有三角状卵形叶鞘，长约 4 毫米，边缘膜质；叶片轮廓宽卵形，2 回羽状全裂，第一回羽片有柄，末回裂片线形，长 2—4 厘米，宽 0.5—1 毫米，边缘反卷，光滑无毛；茎上部叶稀少，叶柄短缩，最上部叶无柄，仅有三角状叶鞘，仅具 2 线状裂片。复伞形花序多分枝，总苞片 1—2 或无，钻状披针形，长 2—3 毫米；伞形花序直径 2—4 厘米；伞辐 6—10，近等长；小伞形花序有花 10—15；小总苞片 6—8，钻状披针形，边缘膜质，比花柄短，常反曲；子房和果实的基部有圆形白色膜盘，直径 0.6—1 毫米；花瓣近圆形，白色，中肋黄色，光滑无毛；花柱外曲，花柱基圆锥形；无萼齿。分生果椭圆形，两侧扁压，横剖面呈五边形，长 3—3.5 毫米，宽 1—1.2 毫米，果棱线形突起，表面有乳头状毛，有时近于光滑；每棱槽内油管 1，合生面油管 2；胚乳腹面平直。花期 6—7 月，果期 8—9 月。

产我国新疆阿尔泰山区。生于海拔 1000—1500 米沙质干燥山坡草地。分布苏联欧洲部分南部和西伯利亚西部。模式标本采自苏联。

2. 内蒙西风芹 内蒙邪蒿(内蒙古植物志) 图版 74: 9—11

Seseli intramongolicum Y. C. Ma, 内蒙古植物志 4: 171. 1979.

多年生草本，高 30—60 厘米。根颈粗短，存留多数枯鞘纤维；根圆柱形，径 4—8 毫米，有时分叉，灰棕色，近木质化。茎单一，或于根颈处指状分叉，数茎呈丛生状，直立，圆柱形，髓部充实，表面有纵长极细条纹，光滑无毛，中下部开始分枝，常呈二叉状多次分枝。基生叶多数，叶柄长 5—9 厘米，基部有卵形具膜质边缘的叶鞘抱茎；叶片轮廓长圆形或长



1—7.狭盘西风芹 *Seseli glabratum* Willd. ex Schult.: 1. 植株, 2. 花, 3. 花瓣, 4. 总苞片, 5. 小总苞片, 6. 果实, 7. 分生果横剖面。8—13.大果西风芹 *Seseli aemulans* M. Pop.: 8. 植株一部分, 9. 总苞片, 10. 小总苞, 11. 果序, 12. 果实, 13. 分生果横剖面。(史渭清绘)