

本组我国仅有 1 种。

16. 锐齿西风芹 黄花邪蒿(秦岭植物志) 图版 78: 1—8

Seseli incisodentatum K. T. Fu, 秦岭植物志 1 (3): 412. 1981.

多年生草本, 高 30—50 厘米。根颈稍粗, 有存留的枯鞘纤维; 根圆柱形, 灰黄色。茎单一或数茎, 纤细圆柱形, 基部径 2—3 毫米, 有纵长细条纹稍突起, 自下部开始分枝, 分枝较多而开展。基生叶有柄, 叶柄长 5—7 厘米, 基部有叶鞘, 边缘膜质; 叶片轮廓卵形, 3 回羽状分裂, 第一回羽片 4—6 对, 有短柄, 最下面羽对相距较远, 第二回羽片 3—4 对, 羽片基部有少数鳞片状短毛, 末回裂片卵形, 长 4—10 毫米, 宽 3—5 毫米, 有 1—3 锐齿或呈羽状分裂; 茎上部叶逐渐退化, 1 回羽状分裂或 3 裂, 短柄或无柄, 仅有稍宽阔的叶鞘; 序托叶无柄, 叶片不分裂, 丝线形, 生于宽阔的叶鞘上。复伞形花序多分枝, 花序梗顶端和伞辐基部有稀疏鳞片状毛, 花序直径 3—6 厘米; 无总苞片; 伞辐 5—7, 不等长, 长 1—2.4 厘米, 较纤细; 小伞形花序有花 8—12; 小总苞片 5—7, 狭线形, 长 1—2 毫米, 比花柄短; 花柄不等长, 长 2—4 毫米; 花瓣长圆形, 小舌片细长内曲, 黄色; 萼齿宽三角形; 花柱粗短, 花柱基短圆锥形。分生果长圆形, 长约 2 毫米, 果棱丝线形, 轻微突起, 侧棱不宽; 每棱槽内油管 2—3, 合生面油管 4—6。 花期 8—9 月, 果期 9—10 月。

产甘肃文县。生于海拔 900 米左右山坡草地或路旁。模式标本采自甘肃文县。

57. 水芹属——*Oenanthe* L.

L. Sp. Pl. 254. 1753.——*Phellandrium* L. Sp. Pl. 255. 1753.

——*Dasylooma* DC. Prodr. 4: 140. 1830.


光滑草本, 二年生至多年生, 很少为一年生, 有成簇的须根。茎细弱或粗大, 通常呈匍匐性的上升或直立, 下部节上常生根。叶有柄, 基部有叶鞘; 叶片羽状分裂至多回羽状分裂, 羽片或末回裂片卵形至线形, 边缘有锯齿呈羽状半裂, 或叶片有时简化成线形管状的叶柄。花序为疏松的复伞形花序, 花序顶生与侧生; 总苞缺或有少数窄狭的苞片; 小总苞片多数, 狭窄, 比花柄短; 伞辐多数, 开展; 花白色; 萼齿披针形, 宿存; 小伞形花序外缘花的花瓣通常增大为辐射瓣; 花柱基平压或圆锥形, 花柱伸长, 花后挺直, 很少脱落。果实圆卵形至长圆形, 光滑, 侧面略扁平, 果棱钝圆, 木栓质, 两个心皮的侧棱通常略相连, 较背棱和中棱宽而大。分生果背部扁压; 每棱槽中有油管 1, 合生面油管 2; 胚乳腹面平直; 无心皮柄。

约 30 种。分布于北半球温带和南非洲。我国产 9 种 1 变种, 主产于西南及中部地区。

本属模式种 *Oenanthe fistulosa* L.

水芹属分种检索表

1. 叶片通常简化, 羽片成对稀疏排列在叶轴上部…………… 1. 高山水芹 *O. hookeri* C. B. Clarke



1—8.锐齿西风芹 *Seseli inciso-dentatum* K. T. Fu: 1.植株, 2.根部, 3.花序, 4.小总苞片, 5.花, 6.花瓣, 7.果实, 8.分生果横剖面。9—11.无柄西风芹 *Seseli sessiliflorum* Schrenk: 9.花, 10.花瓣, 11.幼果。(史渭清绘)