

本属模式种：茴香 *Anethum foeniculum* L. = *Foeniculum vulgare* Mill.

1. 茴香(本草纲目) 菴蓂(唐本草), 小茴香(中药名称) 图版 86

Foeniculum vulgare Mill. Gard. Dict. ed. 8. 1: 1768; Diels in Engl. Jahrb. 29: 499. 1901; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 722. 1933; 中国高等植物图鉴 2: 1081. 图 3892. 1972; 东北草本植物志 6: 228. 1977; 新疆药用植物志 1: 98. 1977; 秦岭植物志 1 (3): 414. 1981.——*Anethum foeniculum* L. Sp. Pl. ed. 1. 263. 1753.——*Ligusticum foeniculum* Crantz, Class. Umbell. Emend. 82. 1767.——*Foeniculum officinale* All. Fl. Pedem. 2: 25. 1785.——*Ozodia foeniculacea* Wight et Arn. Prodr. Fl. Ind. Or. 375. 1834.——*Foeniculum foeniculum* Karsten, Fl. Deutschl. 2: 462. 1895.

草本,高 0.4—2 米。茎直立,光滑,灰绿色或苍白色,多分枝。较下部的茎生叶柄长 5—15 厘米,中部或上部的叶柄部分或全部成鞘状,叶鞘边缘膜质;叶片轮廓为阔三角形,长 4—30 厘米,宽 5—40 厘米,4—5 回羽状全裂,末回裂片线形,长 1—6 厘米,宽约 1 毫米。复伞形花序顶生与侧生,花序梗长 2—25 厘米;伞辐 6—29,不等长,长 1.5—10 厘米;小伞形花序有花 14—39;花柄纤细,不等长;无萼齿;花瓣黄色,倒卵形或近倒卵圆形,长约 1 毫米,先端有内折的小舌片,中脉 1 条;花丝略长于花瓣,花药卵圆形,淡黄色;花柱基圆锥形,花柱极短,向外叉开或贴伏在花柱基上。果实长圆形,长 4—6 毫米,宽 1.5—2.2 毫米,主棱 5 条,尖锐;每棱槽内有油管 1,合生面油管 2;胚乳腹面近平直或微凹。花期 5—6 月,果期 7—9 月。

原产地中海地区。我国各省区都有栽培。

嫩叶可作蔬菜食用或作调味用。果实入药,有驱风祛痰、散寒、健胃和止痛之效。


60. 苜蓿属——*Anethum* L.

L. Sp. Pl. 263. 1753; Wight et Arn. Prodr. Fl. Ind. or. 1:

371. 1834.——*Peucedanum* sect. *Anethum* Benth. et Hook. f.

Gen. Pl. 1: 919. 1867.

一、二年生草本,高 60—120 厘米。茎直立,圆柱形,分枝,光滑,无毛。基生叶轮廓卵形或宽卵形,有叶柄,长 5—6 厘米,基部有叶鞘,长 1.5—3 厘米,宽约 1—1.5 厘米,边缘白色,膜质;叶片 2—3 回羽状全裂,末回裂片丝线形,长 4—20 毫米,宽不及 0.5 毫米。复伞形花序多分枝;无总苞和小总苞;伞形花序直径 5—15 厘米;伞辐 10—25,稍不等长;小伞形花序有花 15—25;花柄长 5—6 毫米;花瓣黄色,内曲,早落;无萼齿;花柱短,初时直立,果期向下弯曲,花柱基圆锥状或垫状。分生果椭圆形或卵状椭圆形,顶端略尖,背部扁压状,灰褐色,背棱线形,稍突起,侧棱呈狭翅状,浅灰色,长 3—4 毫米,宽 2—2.5 毫米;每棱槽内油管 1,合生面油管 2;胚乳腹面平直;分生果易分离和脱落。花果期 5—8 月。



茴香 *Foeniculum vulgare* Mill.:

1.根, 2.茎上部的叶, 3.花, 4.花瓣, 5.果序, 6.果实, 7.分生果横剖面。(史渭清绘)