

布于欧洲及东南亚地区。

果实入药,有驱虫作用,又可提取芳香油。

1b. 胡萝卜(变种)(本草纲目)

var. *sativa* Hoffm. *Deutschl. Fl.* ed. 1. 91. 1791.

本变种与原变种区别在于根肉质,长圆锥形,粗肥,呈红色或黄色。

全国各地广泛栽培。根作蔬菜食用。并含多量维生素甲、乙、丙及胡萝卜素。用种子繁殖。

增 补 属 种

1. 天胡荽亚科——HYDROCOTYLOIDEAE Drude

1. 天胡荽属——*Hydrocotyle* L.

1. 钝裂天胡荽(变种)(植物分类学报)

Hydrocotyle salwinica Shan et S. L. Liou var. *obtusiloba* S. L. Liou in *Act. Phytotax. Sin.* 28(2): 152. 1990.

本变种与原种的区别在于植物体矮小,高10—28厘米,叶肾圆形,通常7浅裂,裂片钝圆,边缘有细齿。花期7月。

产我国西藏(米林、林芝、察隅、易贡)。生长于海拔2500—3100米的林下草丛或水沟边。模式标本采自米林。

2. 变豆菜亚科——SANICULOIDEAE Drude

4. 变豆菜属——*Sanicula* L.

1. 疏花变豆菜(变种)(植物分类学报)

Sanicula tienmuisis Shan et Constance var. *pauciflora* Shan et Pu in *Act. Phytotax. Sin.* 27(1): 66. 1989.

本变种的小伞形花序仅有2—3朵雄花,而原变种每个小伞形花序有5—6朵雄花。花期5月。

产四川(泸定)。生长于海拔高2200米的沟边或林下。模式标本采自泸定。