

61a. 峨马杜鹃 (原变种) 图版 27: 6—11

Rhododendron ochraceum Rehd. et Wils. var. *ochraceum*

灌木, 高 2—6 米; 幼枝被黄白色短柔毛和腺毛, 一年生枝黑褐色, 在花序下小枝直径 3—3.5 毫米。冬芽长卵圆形, 长 1.5 厘米, 直径约 4 毫米, 被灰色绒毛。叶薄革质, 倒披针形, 长 5—8.5 厘米, 宽 1.2—2.5 厘米, 先端突尖或尾状渐尖, 基部圆形或宽楔形, 边缘微反卷, 上面亮绿色至暗绿色, 下面密被薄的淡黄褐色绒毛状丛卷毛, 中脉在上面稍凹下, 下面隆起, 密被丛卷毛, 侧脉 11—13 对, 在上面不明显, 下面没入毛被中; 叶柄细圆柱形, 长 1—1.5 厘米, 散生短柔毛及有腺头的长毛。顶生短总状伞形花序, 有花 8—12 朵; 总轴长约 6 毫米, 被黄褐色柔毛; 花梗长 6—12 毫米, 密被淡黄白色有腺头的细毛; 花萼小, 杯状, 长约 1.5 毫米, 红色, 裂齿 5, 不整齐, 宽三角形, 先端急尖, 外被微柔毛; 花冠宽钟形, 长 2.7—3 厘米, 直径 3—3.3 厘米, 深紫红色, 无毛, 裂片 5, 近于圆形, 长约 1 厘米, 宽约 1.2 厘米, 顶端有缺刻; 雄蕊 10—12, 不等长, 长 1.2—1.9 厘米, 花丝白色, 无毛, 花药紫黑色, 长圆形, 长 1.2—1.3 毫米; 子房圆锥形, 长 3.5 毫米, 直径 3 毫米, 密被淡白色有腺头的粗毛, 花柱长 2.3 厘米, 无毛, 柱头小, 头状, 宽约 1.3 毫米。蒴果圆柱形, 长 1.8—2.5 厘米, 直径 3—5 毫米, 直或弯曲, 有毛被残迹。花期 5—7 月, 果期 8—9 月。

产四川东南部和西南部、云南东北部。生于海拔 1850—2800 米的密林下。模式标本采自四川西部瓦屋山。

61b. 短果峨马杜鹃 (变种) (植物研究) 图版 27: 1—5

Rhododendron ochraceum Rehd. et Wils. var. *brevicarpum* W. K. Hu in Bull. Bot. Res. 8(3): 56. 1988.

本变种与原变种的区别在于叶片下面有海绵质的毛被; 花冠狭钟形, 长达 4 厘米; 蒴果较短, 长仅 1.3 厘米, 直径 6 毫米, 有宿存具腺头的刚毛。

产四川东南部。生于海拔 1700—2960 米的竹林内或森林中。模式标本采自四川南川金佛山。

62. 绒毛杜鹃 (峨眉植物图志)

Rhododendron pachytrichum Franch. in Bull. Soc. Bot. France 33: 231. 1886 et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Ser. 2, 10: 49 (Pl. Davidian 2: 87. 1888) 1888; Rehd. et Wils. in Sargent, Pl. Wils. 1: 530. 1913; Tagg in Stevenson, Spec. Rhodod. 152. 1930; Fang in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China Bot. 12: 31. 1939; et Fang, Icon. Pl. Omei. 1(1): Pl. 22. 1942; 中国高等植物图鉴 3: 87, 图 4128. 1974; Cullen et Chamb. in Not. Bot. Gard. Edinb. 36: 118. 1978; Chamb. in Not. Bot. Gard. Edinb. 39: 270. 1982, pro parte, excl. syn. *R. monosematum* Hutch.; 峨眉山杜鹃花 48, 图 15. 1986; 中国四川杜鹃花 89—91. 1986; 云南植物志 4: 390. 1986.