

209. 察隅杜鹃 (西藏植物志)

Rhododendron piercei Davidian in Quart. Bull. Amer. Rhodod. Soc. 30: 211. 1976; Cullen et Chamb. in Not. Bot. Gard. Edinb. 37: 333. 1979; Chamb. in Not. Bot. Gard. Edinb. 39: 387. 1982; 西藏植物志 3: 593. 1986. — *R. beanianum* Cowan var. *compactum* Cowan in Not. Bot. Gard. Edinb. 21: 149. 1953.

披散灌木, 高 1.5—2.5 米; 幼枝被绒毛。叶革质, 椭圆形至长圆形, 长 4—11 厘米, 宽 2—5.2 厘米, 先端圆形, 有长突尖头, 长 1—1.5 毫米, 基部圆形, 上面绿色, 成长后无毛, 有皱纹, 中脉凹下, 侧脉 11—13 对, 凹入, 下面有两层毛被, 上层毛被厚, 淡黄褐色, 由分枝的绒毛组成, 下层为淡白色稀疏的短柔毛, 紧贴, 中脉在中部以下凸出, 被淡黄褐色短柔毛, 侧脉没入毛被中; 叶柄稍粗壮, 长 7—10 毫米, 疏被淡黄褐色绒毛, 上面有浅沟, 下面圆形。花序有花 6—8 朵; 总轴长 5 毫米; 花梗长 12—15 毫米, 被绒毛; 花萼长 3—6 毫米, 无毛, 裂片不规则; 花冠管状钟形, 长 2.8—3.6 厘米, 深红色, 肉质, 基部内面有 5 枚深色的蜜腺囊; 雄蕊 10, 不等长; 子房密被绒毛。蒴果长 14—18 毫米, 直径 4.5 毫米。

产我国西藏东南部。生于海拔 3 900—4 200 米的灌丛中。模式标本采自西藏察隅。

本种我们见到了 K. Ward 的 11040 号具叶的标本, 但尚未见到具花和具果的标本, 上列花、果的描述系根据 1982 年 D. F. Chamberlain 的描述写成的, 待以后见到花、果标本时再进行修改补充。

210. 杯萼杜鹃 (西藏植物名录)

Rhododendron pocophorum Balf. f. ex Tagg in Not. Bot. Gard. Edinb. 15: 316. 1927. et in Stevenson, Spec. Rhodod., 526. 1930; Cullen et Chamb. in Not. Bot. Gard. Edinb. 37: 334. 1979; Chamb. in Not. Bot. Gard. Edinb. 39: 387. 1982; 西藏植物志 3: 595. 1986; 云南植物志 4: 436. 1986.

210a. 杯萼杜鹃 (原变种) 图版 91: 1—4

Rhododendron pocophorum Balf. f. ex Tagg var. **pocophorum**

常绿灌木, 高 0.6—3 米; 幼枝密被腺头细刚毛, 在花序下的小枝直径 5—6 毫米。冬芽卵圆形, 长 1—1.3 厘米, 略有微柔毛。叶厚革质, 长圆形至倒卵形, 长 6.5—14 厘米, 宽 2.5—5.6 厘米, 先端钝圆, 有明显的小尖头, 基部楔形, 上面粉绿色, 成长后无毛, 下面被棕色有分枝的厚绒毛, 中脉在上面凹陷, 下面稍隆起, 常没入毛被中, 侧脉 12—14 对, 在上面稍凹下; 叶柄粗壮, 长 1—1.5 厘米, 被有腺头细刚毛及分枝绒毛。顶生密伞形花序, 有花 10 (—20) 朵; 总轴长约 5 毫米, 被黄棕色绒毛; 花梗长 0.7—1.8 厘米, 密被腺头细刚毛和绒毛; 花萼大, 长 6—10 毫米, 杯状, 外面无毛, 裂片 5, 不规则, 边缘具腺头睫毛; 花冠管状钟形, 肉质, 长 4—5 厘米, 淡红至深红色, 内面一边有深红色细斑点, 基部有深色的蜜腺囊, 裂片 5, 扁圆形, 长 1.5 厘米, 宽 2 厘米, 有深刻; 雄蕊 10, 不等长, 长 2—3.5 厘米, 花丝无毛, 花药长圆形, 长 2.7—3.5 毫米; 子房