

杜鹃花科——ERICACEAE

2. 绣木亚科——ANDROMEDEDOIDEAE (Drude) E. Busch

E. Busch in Kom. Fl. URSS 18: 66. 1952. — *Andromedaceae*

Drude in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(1): 40. 1897, pro trib.

通常为常绿灌木，植株大多无毛，稀有鳞片或腺毛；花通常 5 数；花萼与子房分离，花受精后花萼大小几无变化；花冠坛状或钟状，花后脱落；花药顶孔裂或缝裂，背部有芒或钝形无芒；蒴果室背开裂，果瓣中部有隔膜；种子有翅或无翅。

约含 16 属，主产美洲，大多数产暖温带，少数种类产欧洲和北西伯利亚，亚洲分布于东喜马拉雅，南至东南亚巽他群岛，1 属产非洲，限于马达加斯加。我国有 7 属：岩须属、吊钟花属、木藜芦属、马醉木属、珍珠花属、金叶子属及地桂属。

5. 岩须属*——*Cassiope* D. Don

D. Don in Edinb. New Phil. Journ. 17: 157. 1834.

常绿矮小灌木或半灌木。茎平铺或上升。叶片小，互生或交互对生，鳞片状，无柄，通常覆瓦状排列成 4 行，或斜展而不为覆瓦状，全缘，有时边缘有流苏状缘毛，背面有 1 深槽或平坦或弓突。花单一，腋生稀顶生，常弯垂；萼裂片 4—5，蕾期覆瓦状排列，果期开展，不增大；花冠钟形，白色或淡红色，裂片 4—5，短而外弯；雄蕊 8—10，稀 12，着生花冠内侧基部，花丝线形，纤细，花药卵形，顶部有 2 芒，芒通常反折；花盘具 10 个钝齿；子房上位，4—5 室，花柱柱状，柱头单一，每室有多数胚珠。蒴果圆球形，室背开裂。种子细小，长椭圆形，劲直或弯曲，两端钝或具附属物。

约 20 种，分布北半球的环极地区，南经苏联、中国、日本、喜马拉雅地区、克什米尔地区。我国有 11 种，产四川、云南、西藏，常见于高山。

本属模式种：四棱岩须 *Cassiope tetragona* (Linn.) D. Don

分种检索表

1. 叶背面无沟槽。
 2. 叶背面凸起成椭圆形的泡状，被细长刚毛，叶小，长 2—2.5 毫米，宽约 1 毫米……………1. 鼠尾岩须 *C. mysuroides* W. W. Smith
 2. 叶背面平坦或仅边缘加厚。
 3. 叶背面平坦，边缘不加厚，干膜质，疏被白色短柔毛……………2. 垫状岩须 *C. pulvinalis* T. Z. Hsu

* 岩须属(中国高等植物图鉴)，锦缘花属(中国种子植物科属辞典)。