

裂,长 1.5 毫米,芒长约 1 毫米;子房球形,具 5 纵纹,疏被白色短毛,花柱长约 5.5 毫米,被疏微毛。蒴果卵圆形,直径 6—7(—8) 毫米,室背开裂为 5 果瓣,果片长约 6 毫米,宽约 3.2 毫米,果片中间具微纵槽。种子长约 6 毫米,微有光泽,具皱纹,有翅,每室有种子多数,种子着生于中轴之上部。花期 5 月,果期 6—10 月。

产安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南。生于海拔 900—3 600 米的山坡疏林中。模式标本采自云南西部。

本种是本属中分布较广的种。叶、花、果的形状、大小以及毛被等特征变异较大。本种与毛叶吊钟花 *E. deflexus* (Griff.) Schneid. 极为相似,但后者花梗、叶柄、叶背面常被柔毛,特别是叶背面脉上及脉腋密被平伏粗毛,叶常较大,花药上的芒与花药等长,花萼披针状三角形,不难区别。

组 3. 单花组——Sect. 3. *Monanthus* T.Z. Hsu in Act. Bot. Yunn. 4: 356. 1982.

通常单花,稀 2 花;果柄弯曲,果下垂。

本组仅 1 种。分布于我国西南部。

本组模式种: 单花吊钟花 *Enkianthus pauciflorus* Wils.

9. 单花吊钟花(云南植物研究) 少花灯笼花(中国高等植物图鉴)

Enkianthus pauciflorus Wils. in Gard. Chron ser. 3. 41: 363. 1907 et in Fedde, Repert. Sp. Nov. 7: 235. 1909; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1: 200. 1924; Fang in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China Bot. Ser. 10: 27. 1935; 中国高等植物图鉴 3: 172. 1974, in nota; T.Z. Hsu in Act. Bot. Yunn. 4: 360. 1982; 云南植物志 4: 575. 1986.

灌木,高 1—3 米;小枝纤细,暗褐色,被微毛;芽顶生,红褐色,芽鳞长卵形,长 6—7 毫米,宽 2.5(—3) 毫米,无毛,先端具尖头。叶密集枝顶,长椭圆形至长卵形,厚纸质,长 (1.5—)2—2.5(—3) 厘米,宽 (0.8—)1—1.2 厘米,先端渐尖,有小尖头,基部楔形,渐狭成柄,边缘具细锯齿,表面绿色,无毛,背面淡绿色,疏被微柔毛,中脉在表面不明显,在背面隆起,侧脉在背面稍明显;叶柄短,长约 2 毫米,近无毛。单花,稀 2 朵花自叶丛中生出,花未见。蒴果卵形,直径 3—7 毫米,幼时绿色,成熟时褐色;果梗纤细,长约 1 厘米,明显弯曲。种子小,黄褐色,具翅。果期 6—10 月。

产四川(洪雅、汉源、峨边)、云南(贡山、德钦)。生于海拔 3 000—3 700 米的高山灌丛中。模式标本采自四川洪雅。缅甸(西北部)也有。

据《广西植物名录》记载,广西大瑶山有分布。但未见标本、附记于此,待以后确认。

7. 木藜芦属*——*Leucothoe* D. Don

D. Don in Edinb. New Phil. Journ. 17: 159. 1834; Sleumer

* 木藜芦属(中国高等植物图鉴)。

in Notizbl. Bot. Gart. Berlin **13**: 211—213. 1936.

常绿或落叶灌木;枝常左右曲折。叶互生,全缘或有齿,叶具柄。总状花序顶生或腋生,具苞片和小苞片;花萼5裂,宿存;花冠卵状球形,坛状或圆柱形,5裂,裂片小,花蕾时覆瓦状排列;雄蕊10枚,不外露,花药长圆形,顶端钝,顶孔开裂,背部无芒或有芒,有时顶部有短而直立的角;子房上位,5室,每室有胚珠多数。蒴果扁球形,室背开裂。种子小,多数,具网纹或狭翅。

约44种,分布于南、北美洲,东亚,南至越南北部,但主产美洲。我国有3种,产云南、西藏。

本属模式种:腋序木藜芦 *Leucothoë axillaris* (Lam.) D. Don.

分种检索表

1. 叶基部楔形或钝圆;叶柄长8毫米以上。
 2. 叶椭圆形,基部楔形,近全缘;蒴果直径3.5—4毫米 1. 尖基木藜芦 *L. griffithiana* C. B. Clarke
 2. 叶椭圆状卵形或宽椭圆形,基部钝圆,边缘具细尖锯齿;蒴果直径4—6毫米 2. 圆基木藜芦 *L. tonkinensis* Dop
1. 叶基部耳状心形;叶柄短,长不超过2毫米 3. 短柄木藜芦 *L. sessilifolia* C. Y. Wu et T. Z. Hsu

1. 尖基木藜芦(中国高等植物图鉴) 当琴(云南贡山) 图版6: 1—3

Leucothoë griffithiana C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit.-Ind. **3**: 460. 1882; W. W. Smith in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **13**: 164. 1921, descr. ampl.; 中国高等植物图鉴 **3**: 173.图 4299. 1980; 西藏植物志 **3**: 684.图 274: 1—3. 1986; 云南植物志 **4**: 577. 图版 164, 1—5. 1986.

常绿灌木,高3—4米;枝条稀疏,左右曲折,下垂,无毛。叶椭圆形,长11—14厘米,中部宽3.5—4.5厘米,革质,顶端尾状渐尖,基部楔形,全缘或向顶端疏具钝细齿,两面无毛,表面干后棕色,背面多少有凹点;叶柄长8—10毫米,无毛。总状花序腋生,长3—5厘米,花序梗基部有少数棕色宽卵形的鳞片状苞片,苞片长约3毫米,卵形,先端微尖头;小苞片2,对生,着生于花梗中部,长约1毫米,微渐尖;花萼长约2毫米,肉质,基部连合;花冠近坛形,长5—6毫米,直径约4毫米,裂片5,卵形、无毛;雄蕊10枚,长约2毫米,无毛,花药长约1毫米,稍超出花冠,背部具2芒;子房扁球形,花柱单一,长约3毫米。蒴果扁球形,直径3.5—4毫米,无毛,室背开裂。种子球形,压扁,直径约1.2毫米,边缘有鳞片状乳凸。花期5月,果期6—10月。

产云南西北部、西藏(墨脱、察隅)。生于海拔(1300—)2500—3400米的山谷密林中或沟边杂木林中。不丹亦有。

2. 圆基木藜芦(中国高等植物图鉴) 图版6: 4—5