

Lévl. var. *parvifolia* Lévl. in l. c. **25**: 21. 1915. — *Xolisma ovalifolia* (Wall.) Rehd. var. *hebecarpa* (Franch. ex Forb. et Hemsl.) Metc. in Journ. Arn. Arb. **12**: 275. 1931.

与原种不同在于蒴果近于球形,密被柔毛;叶卵形、倒卵形或椭圆形,长5—12厘米,宽3—6厘米。

产江苏、安徽、浙江、广东、广西、四川、云南西北部。生于海拔1400—3400米的阳坡灌丛中,模式标本采自浙江。

2. 圆叶珍珠花 圆叶南烛(中国高等植物图鉴)、圆叶米饭花(云南植物志) 图版9: 1—5

Lyonia doyonensis (Hand. -Mazz.) Hand. -Mazz. Symb. Sin. **7**(4): 789. 1936; 中国高等植物图鉴 **3**: 176. 图 4305. 1974; 云南植物志 **4**: 571. 图版 161, 5—6. 1986. — *Pieris doyonensis* Hand. -Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien Math.-Nat. Kl. **60**: 185. 1923. — *Lyonia ovalifolia* (Wall.) Drude var. *doyonensis* (Hand. -Mazz.) Judd in Journ. Arn. Arb. **62**: 158. fig. 22. 1981.


灌木或小乔木,高6—12米;小枝无毛;冬芽较大,椭圆形,深棕色,有光泽,无毛。叶革质,近圆形,长与宽几相等,长8—12厘米,宽7—11厘米,先端急尖或短渐尖,基部圆形或浅心形,表面深绿色,背面淡绿色,两面均有黄棕色短柔毛,中脉在背面橙红色;叶柄较粗,长7—15毫米。总状花序长9—15厘米,花序轴粗壮,基部有2—3枚叶状苞片,小苞片早落;花梗长3—4毫米,略带红色,花萼5裂,裂片长约2毫米,宽约1.5毫米,宿存;花冠白色,圆筒状,长9—13毫米,直径3.5—6.5毫米,外面疏被白色柔毛,上部浅5裂,裂片向外反曲,先端钝圆;雄蕊10枚,花丝有毛,顶端有2个芒状附属物;子房近球形,无毛,直径3.5—5毫米。蒴果较大,近球形,直径7—9毫米,缝线明显增厚,无毛。花期4—6月,果期7—8月。

产四川、云南西北部、西藏东南部。生于海拔2400—3400米的开阔山坡灌丛中。模式标本采自云南贡山。缅甸(北部)也有。

3. 秀丽珍珠花 美花米饭花(云南植物志) 图版10: 1—4

Lyonia compta (W. W. Smith et Jeffr.) Hand. -Mazz. Symb. Sin. **7**: 790. 1936; Chun in Sunyatsenia **4**: 253. 1940; Judd in Journ. Arn. Arb. **62**: 145. fig. 20. 1981; 云南植物志 **4**: 566. 1986. — *Pieris compta* W. W. Smith et Jeffr. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **9**: 116. 1916. — *Xolisma compta* (W. W. Smith et Jeffr.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. **5**: 53. 1924.

灌木,高约2米;小枝圆柱形,细瘦,幼时微被毛,老时脱落而近于无毛;冬芽较小,卵形,芽鳞外被毛。叶革质,椭圆形,长1.5—3.5厘米,宽6—11毫米,表面绿色,无毛,背面灰白色,近于无毛,边缘略向背面反卷,先端钝,具小尖头,基部阔楔形,中、侧脉在表面均



1—5. 圆叶珍珠花 *Lyonia doyonensis* (Hand. -Mazz.) Hand. -Mazz.: 1. 果枝, 2. 花, 3. 果, 4—5. 叶。6—13. 珍珠花 *Lyonia ovalifolia* (Wall.) Drude: 6. 花枝, 7. 花, 8. 雄蕊, 9. 花药, 10. 果, 11—13. 叶。(李纬绘)