

短柔毛；苞片披针形，长约2毫米，有睫毛，脱落；小苞片2，着生于花梗近中部；花梗长2—3毫米，被微柔毛；花萼杯状，直径2—3毫米，疏被柔毛，裂片近圆形，具睫毛；花冠短钟形，被毛；雄蕊10枚，不伸出花冠外，花丝无毛，花药基部近囊状；花柱长约2毫米。蒴果扁球形，顶部凹陷，高约14毫米，直径约18毫米，外果皮木质化；每室有种子12—14枚；种子近卵圆形，压扁，长约2毫米，宽约2毫米，具纵条纹。花期5—6月，果期7—8月。

产广东(鼎湖山)、广西(十万大山)。生于海拔约600米以上的山地。模式标本采自广东鼎湖山。

2. **金叶子** 老火树(云南)，粗糠树、假吊钟、火炭木(广西)，星芒克榴木、三百棒、小栗叶、狗脚草根(中药大辞典)，假木荷(中国高等植物图鉴) 图版12: 1—3

Craibiodendron stellatum (Pierre) W. W. Smith in Kew Bull. 1914: 129. 1914; 中国高等植物图鉴 3: 180, 图 4313. 1974; 云南植物志 4: 583. 图版 166. 1986; Judd in Journ. Arn. Arb. 67: 464. fig. 8. 1986. — *Schima stellatum* Pierre, Fl. Forest. Cochinch. 1: t. 122. 1887. — *Craibiodendron shanicum* W. W. Smith in Rec. Bot. Surv. India 4: 277. 1911.

常绿小乔木，高3—8米，小枝无毛。叶互生，厚革质，椭圆形，长6—10(—13)厘米，宽3.5—4.5(—6)厘米，先端钝圆或凹缺，基部钝或近圆形，全缘，稍反卷，两面无毛，背面疏被黑色小腺点，中脉在表面下陷，在背面隆起，侧脉14—18对，平行，在表面明显，在背面隆起；叶柄粗短，长约5毫米。圆锥状花序顶生，花序轴长15(—20)厘米，被灰色微毛；花白色，有香气；花萼裂片基部合生，裂片宽卵形，有柔毛；花冠钟形，长3—4毫米，具毛，5浅裂，裂片直立；雄蕊10枚，长几等于花冠，花丝具疏毛，中部弯曲；子房被毛。蒴果扁球形，直径达12毫米。花期7—10月，果期10月至翌年4月。

产广东、广西、贵州、云南。生于海拔(250—)700—1600(—2700)米的疏林中。缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南也有。

根含狗脚草素 $C_{21}H_{29}O_6$ ，有抗炎、镇痛之效，用于治风湿性关节疼痛。

3. **柳叶金叶子**(云南植物志) 柳叶假木荷(中国高等植物图鉴)、毒药树(云南) 图版12: 4

Craibiodendron henryi W. W. Smith in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 5: 158. 1912; 中国高等植物图鉴 3: 178, 图 4310. 1974; 西藏植物志 3: 691. 1986; Judd in Journ. Arn. Arb. 67: 459. fig. 6. 1986; 云南植物志 4: 583, 图版 167, 1—5. 1986。

小乔木，高8—15米；树皮灰黑色，小枝圆柱形，无毛。叶互生，革质，披针形，长10—15厘米，宽2—3.5(—5)厘米，先端渐尖，基部楔形，全缘，两面无毛，表面绿色，背面淡绿色，疏生近黑色小腺点，中脉在表面下陷，在背面隆起，侧脉10—14对，在背面隆起，网脉



1—3. 金叶子 *Craibiodendron stellatum* (Pierre) W. W. Smith: 1. 果枝, 2. 花外形, 3. 雄蕊。
4. 柳叶金叶子 *Craibiodendron henryi* W. W. Smith: 果枝。(肖溶绘)