

苏门答腊、爪哇。我国24种,产西南、华南,东至台湾。

本组模式种: *V. dialypetalum* J. J. Smith (产泰国、马来半岛、印度尼西亚)

1. 粉白越桔(西藏植物志)

Vaccinium glauco-album Hook. f. ex C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 453. 1882; Brandis, Ind. Trees 406. 1906; Anth. in Curtis's Bot. Mag. **147**: t. 8924. 1921; Airy-Shaw in Bull. Misc. Inf. Kew **1935**: 48. 1935, obs. et in Curtis's Bot. Mag. **161**: t. 9536. 1938; Sleumer in Bot. Jahrb. **71**(4): 444. 1941; Merr. in Brittonia **4**: 154. 1941; Hara, Fl. E. Himal. 241. 1966; 西藏植物志 **3**: 726. 图 288: 6. 1986.

常绿灌木,高(0.3—)1—3米。幼枝淡褐色,近于无毛或被短柔毛,散生皮孔,老枝灰色,无毛,散生突起的皮孔。叶散生枝上,叶片薄革质,椭圆形至卵状椭圆形,长4—6厘米,宽2—4厘米,顶端钝至锐尖,有短尖头,基部楔形、宽楔形或有时稍钝,边缘密生具腺细锯齿,至基部两侧各有1腺体,表面黄绿色,背面粉绿色,沿中脉疏生具腺短刚毛,侧脉5—8对,与中脉、网脉在表面略微下陷,在背面稍隆起;叶柄长2—4毫米,无毛。总状花序腋生;长约3厘米,有5—7朵花;序轴疏被短柔毛;苞片叶状,宽椭圆形,锐尖,长1—2厘米,无毛,略被白粉,小苞片2枚,长卵状披针形,长0.7—0.9厘米,无毛,略被白粉,苞片与小苞片常宿存至果期;花梗长3—5毫米,无毛,被白粉,顶端与花萼间明显有关节;萼筒无毛,被白粉,萼齿短小,宽三角形,长约1毫米或更短,无毛;花冠白色,坛状钟形,长约6毫米,内、外均无毛,裂齿短小,反折;雄蕊略短于花冠,花丝扁平,与花药等长,长约2.5毫米,密被开展的短柔毛,药室背部有2上举的距,药管与药室近等长。浆果直径6—8毫米,成熟时紫红色,被白粉。花期6月,果期8—12月。

产云南(景东、贡山)、西藏东南部。生于海拔2900—3250米的山坡灌丛或林缘。分布缅甸(东北部)、印度(东北部)、不丹、锡金、尼泊尔(东部)。

2. 软骨边越桔(中国高等植物图鉴)

Vaccinium gaultheriifolium (“*gaultheriaefolium*”) (Griff.) Hook. f. ex C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 453. 1882; Sleumer in Bot. Jahrb. **71**(4): 445. 1941; Merr. in Brittonia **4**: 156. 1941; 中国高等植物图鉴 **3**: 205. 图 4364. 1974; Hara, Fl. E. Himal. 241. 1966 et 99. 1971; 西藏植物志 **3**: 726. 图 288: 1—5. 1986. —*Thibaudia gaultheriifolia* Griff. Icon. Pl. Asiat. **4**: t. 512. 1854. —*Vaccinium diaphanoloma* Hand. -Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien Math. -Nat. Kl. **62**: 133. 1925 et Symb. Sin. **7**(2): 797. tab. 14, Abb. 2. 1936.

2a. 软骨边越桔(原变种)

var. *gaultheriifolium*

常绿灌木,高2—4米,有时附生;分枝少,枝条细长,稍侧扁,有细棱,无毛。叶散生,