

Vaccinium impressinerve C. Y. Wu in Act. Bot. Yunn. 9: 381. f. 2. 1987.

常绿灌木,匍匐而生;分枝少,枝条细长,褐色,幼枝有狭翅状棱,被短柔毛,老枝灰色,无毛。叶少,1—2片生枝顶,叶片卵形或椭圆形,长4—8厘米,宽2.5—4厘米,顶端钝或微凹,基部楔形至宽楔形,翅状下延,全缘,近基部两侧各有1腺体,鲜时稍肉质,干后厚革质,两面无毛或背面散生贴伏的具腺短毛,中脉粗壮,侧脉4对,近叶缘网结,中脉、侧脉、和网脉在表面深陷,在背面突起;叶柄近无。总状花序生于叶腋,通常有3朵花;苞片小,三角形,长约1毫米,小苞片与苞片相似,着生花梗下部;花梗长1—1.7厘米,上部增粗,与萼筒间明显有关节,无毛;萼筒无毛,萼片5,狭长圆形,长4—6毫米,无毛;花冠淡红色,钟状,长1.2厘米,直径约9毫米,内、外无毛,浅5裂,裂片宽三角形;雄蕊与花冠近等长,花丝扁平,长约3毫米,微弯,两侧密生纤毛,药室背部有2上举的距,药管长于药室2倍。浆果球形,直径8毫米,宿存萼裂片长5—6毫米。花期5—6月。

产云南(西畴、麻栗坡)。生于石灰岩山常绿阔叶林下,有时匍匐在覆盖苔藓的石上,海拔1700米左右。模式标本采自西畴偏岩。

本种匍地生长,叶少,极厚,叶基翅状下延,网脉干时在表面下陷很深,在背面突出,近于无柄;花少,具长梗,花冠粉红色,较大,极易辨认。

5. 罗汉松叶乌饭(植物分类学报) 图版 22: 5—7

Vaccinium podocarpoideum Fang et Z. H. Pan in Act. Phytotax. Sin. 19: 107. 1981.

常绿灌木,高40—90厘米;幼枝淡紫绿色,具棱,被微柔毛,老枝灰褐色,茎皮光滑。叶密生、叶片革质,线状倒披针形或线状披针形,长2.5—3.2厘米,宽3.5—5(—8)毫米,顶端锐尖,基部楔形渐狭,边缘全缘,略反卷,近叶柄两侧各有1腺体,两面无毛,中脉在表面隆起,侧脉3对,在表面略显,中脉和侧脉在背面均平坦不显;叶柄极短,略扁,长约1.5毫米,无毛。花未见。果序总状,生枝顶叶腋,长4—5厘米,序轴具棱,无毛;果梗长6—8毫米,无毛,略被白粉,顶部与果实间有关节;幼果绿色,近球形,直径4—5毫米,无毛,被白粉,冠以宿存花萼,萼齿三角形,长1.5—2毫米,渐尖,无毛。果期7月。

产湖南(新宁)、广西(龙胜)。生于山地或山谷灌木丛中,海拔1100米左右。模式标本采自广西龙胜。

据本种果序伸长,总状,叶片每侧3条侧脉,斜上伸展等特点,移置大叶越桔组 Sect. Galeopetalum 类群中较为恰当。本种的植株体态、叶形、果序等特征与臭越桔 *V. foetidissimum* Lévl. et Van. 极相近,唯本种叶片特狭而不同。均未见到两种的花标本,其他特征尚难比较。

6. 臭越桔

Vaccinium foetidissimum Lévl. et Van. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 9: 447. 1911; Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 344. 1915; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 286. 1934;



1—4. 网脉越桔 *Vaccinium crassivenium* Sleumer: 1. 花枝, 2. 叶片一部分, 3. 花, 4. 雄蕊。
 5—7. 罗汉松叶越桔 *Vaccinium podocarpoideum* Fang et Z. H. Pan: 5. 果枝, 6. 叶片一部分, 7.
 果。(曾孝濂绘)