

产广西(罗城、大苗山、三江)、贵州(安龙、惠水)。生于海拔(400—)1300—1700米的山坡密林或山地灌丛。模式标本采自广西罗城。

13. 拟泡叶乌饭(植物分类学报)

Vaccinium pseudobullatum Fang et Z. H. Pan in Act. Phytotax. Sin. **19**: 108. pl. IV, 3. 1981. — *V. bullatum* auct. non (Dop) Sleumer: 中国高等植物图鉴 **3**: 202. 图 4357. 1974, p. p., quoad pl. Yunnan.

灌木或攀援灌木, 高约3米。幼枝近圆柱形, 灰色或灰褐色, 有多数褐色卵圆形突起的皮孔, 无毛。叶散生, 叶片革质, 椭圆形或卵形, 长11—17.5厘米, 宽5.5—9厘米, 基部钝圆或有时宽楔形, 顶端突尖或短尾状渐尖, 具长1—2厘米的尖尾, 边缘全缘, 反卷, 背面密被淡褐色腺状短毛, 中脉在两面突起, 侧脉8—11对, 上升至叶缘网结, 与网脉在表面均显著下凹, 在背面突出, 致使表面凹凸不平; 叶柄长6—8毫米, 腹面无凹槽, 无毛。总状花序短, 腋生, 长1.5—3厘米, 有6—10朵花, 序轴无毛; 花梗粗壮, 长4—7毫米, 无毛; 苞片倒卵状匙形, 长1—1.2厘米, 早落, 小苞片线形, 长约6毫米, 早落; 萼筒部无毛, 萼片三角状披针形, 长4—6毫米, 无毛; 花冠朱红色, 钟状, 长8—10毫米, 直径6—8毫米, 内、外无毛, 5裂至上部1/3, 裂片卵状三角形, 开展或反折; 雄蕊10, 略短于花冠, 花丝扁平, 微向外弓曲, 长1—2毫米, 无毛或疏生柔毛, 药室背部有2伸展的距, 药管长为药室的2—3倍。幼果球形; 果梗长1.1—2厘米, 顶端膨大, 与果实之间明显有关节。花期2—4月, 果期5月以后。

产云南东南部。生于石灰岩山常绿阔叶林下, 海拔1000—1700米。模式标本采自麻栗坡。

本种与产我国广西及越南的泡泡叶越桔 *V. bullatum* (Dop) Sleumer 相近, 但后者的幼枝、叶柄、花梗、花萼被微柔毛或短柔毛, 花序长得多。

14. 大叶越桔(中国高等植物图鉴)

Vaccinium petelotii Merr. in Univ. Calif. Publ. Bot. **13**: 138. 1926, nec Dop (1930); Sleumer in Bot. Jahrb. **71**(4): 446. 1941; 中国高等植物图鉴 **3**: 203. 1974. — *Agapetes parviflora* Dunn in Journ. Linn. Soc. **35**: 515. 1903, nec *Vaccinium parviflorum* Andrews

常绿灌木, 直立或攀援, 稀附生, 高2—5米。少分枝, 枝条细长, 幼枝无毛, 老枝紫褐色, 多突起的皮孔。叶散生, 叶片革质, 长圆形或长卵形, 长14—21厘米, 宽4.5—8.5厘米, 先端渐尖或短尾尖, 基部圆形而微凹成浅心形, 边缘全缘, 不反卷, 干时表面灰绿色, 无毛, 背面黄褐色, 散生贴伏的具腺短毛, 中脉在两面突起, 侧脉9—12对, 上升至边缘网结, 在表面稍突起或略微下陷, 在背面突起, 网脉在两面略微突起; 叶柄粗短, 圆形, 腹面无凹槽, 长3—6毫米, 无毛。总状花序短, 腋生, 长约3厘米, 有6—7朵花, 序轴无毛; 花梗长0.9—1.2厘米, 无毛; 苞片和小苞片未见; 萼筒无毛, 萼片5, 三角状卵形, 长约3毫米, 无