

毛;花冠短钟状,黄白色,长6—11毫米,直径约6毫米,内、外无毛,裂片三角形,开展或反折;雄蕊略短于花冠,花丝扁平,无毛,药室背部有2伸展的距,药管长为药室的1.5倍。浆果球形,紫红色,直径6—9毫米;果梗长1.5—2厘米。花期9—10月,果期11月以后至次年8月。

产云南东南部。生于沟谷常绿阔叶林中,偶有附生于林中树上,海拔1100—1700米。分布越南(北部)。

15. 临沧乌饭(植物分类学报)

Vaccinium lincangense Fang et Z. H. Pan in Act. Phytotax. Sin. **19**: 108. pl. IV, 2. 1981.

灌木或攀援灌木,高1—3.5米。幼枝光滑无毛,有钝棱,老枝散生圆形突起的皮孔。叶散生,叶片革质,长圆状披针形,长12—17厘米,宽4—6厘米,顶端渐尖或尾状渐尖,基部宽楔形至钝圆,边缘全缘,略反卷,在叶片基部两侧各有1腺体,干后表面浅灰绿色,近于无毛,通常密具黑色腺点,背面淡褐色,散生贴伏的具腺短毛,中脉粗壮,在表面突起或略微下陷,在背面明显突起,侧脉纤细,8—9对,斜上升至叶缘网结,与网脉在表面稍突起而在背面不显或略显,背面除隆起之中脉外其余部分平坦;叶柄粗壮,圆形,腹面无凹槽,无毛,长0.9—1.4厘米。花未见。果序腋生,总状,长6—7厘米,序轴具棱,无毛,有17—20枚果;浆果球形,成熟时紫黑色,直径8毫米;宿存萼片三角形,长约1毫米,无毛;果梗长0.5—1.1厘米,无毛,顶端明显有关节。果期10—12月。

产云南西南部。生于干燥山坡岩石上或林内,海拔2200—2700米。模式标本采自临沧博尚。

此种以其叶片长圆状披针形,侧脉纤细,8—9对,自中脉均匀斜伸,与大樟叶越桔 *V. dunalianum* Wight var. *megaphyllum* Sleumer 略有不同外,几无其他特征可以区分。疑两者为同一种。待有这一地区较为丰富的材料后当可释疑。

16. 樟叶越桔(西藏植物志) 饭米果(云南昆明),长尾越桔(中国高等植物图鉴)

Vaccinium dunalianum Wight in Calcut. Journ. Nat. Hist. **8**: 175. 1847, pro *Dunallianum*; id. Icon. **4**, t. 1194. 1850; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 453. 1882; Dunn in Journ. Linn. Soc. **39**: 530. 1911; Rehd. et Wils. in Sargent, Pl. Wils. **1**: 560. 1913, p. p.; Chung in Mem. Sci. Soc. China **1**: 202. 1924; Dop in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine **3**: 706. 1930; Hand. -Mazz. Symb. Sin. **7**: 796. 1936; Sleumer in Bot. Jahrb. **71**(4): 448. 1941; Merr. in Brittonia **4**: 155. 1941; Hara, Fl. E. Himal. **241**. 1966; 中国高等植物图鉴 **3**: 783. 1974; 西藏植物志 **3**: 728. 1986. — *Epigynium dunalianum* (Wight) Klotzsch in Linnaea **24**: 51. 1851. — *Thibaudia revoluta* Griff. in Ic. Pl. Asiat. **4**, t. 513. 1854.

16a. 樟叶越桔(原变种)