

常绿攀援灌木;分枝少,枝条粗壮,伸长,有棱,幼枝带红色,无毛或略有疏短毛,老枝灰色,无毛。叶散生,叶片革质,椭圆形至卵状长圆形,长5—8(—10)厘米,宽3—4(—5)厘米,顶端渐尖成短尾状或短急尖,基部宽楔形,下延至叶柄,两侧各有2腺体,全缘,表面无毛,背面伏生腺状短毛或无毛,侧脉4—7对,与中脉、网脉在表面下陷,在背面隆起,或网脉在两面均不甚明显;叶柄短,长3—4毫米,无毛。总状花序腋生,长3—5厘米,序轴较粗,有棱,无毛;苞片早落;花梗粗壮,开花时长4—5毫米,花后稍伸长;萼筒无毛,萼齿三角形,长约2毫米;花冠绿白色,钟状,长7毫米,直径5—6毫米,裂片三角形,长2.5毫米,上部反折;雄蕊长约6毫米,花丝长2毫米,被短柔毛,药室背部具有2个长2毫米的距,药管细长,长3毫米。浆果球形,直径5—6毫米。果期7—8月。

产广东、广西。生于林中。模式标本采自广西瑶山古陈。

仅见果标本,花的描述据 Sleumer。

18. 蓝果越桔(海南植物志) 图版 23: 1—3

Vaccinium chunii Merr. ex Sleumer in Bot. Jahrb. 71(4): 450. 1941; 海南植物志 3: 147. 1974.

常绿灌木,高约2米;植株各部分无毛;分枝少,枝条稍粗壮。幼枝褐色,具棱,老枝灰色。叶散生,叶片厚革质,卵形、阔卵形至近圆形,长5—7厘米,宽3—4.5厘米,顶端尾尖,基部宽楔形、截平或钝圆,沿叶柄稍下延,边缘全缘,略反卷,中脉在两面略微突起,侧脉纤细,约7对,在表面略隆起,在背面不显;叶柄长0.5—1厘米。总状花序腋生,长2.5—4厘米,有5—9朵花;花序轴粗壮,具棱;苞片披针形,长约9毫米,早落;花梗粗短,开花后长约3毫米,与萼筒间明显有关节;萼筒部无毛,萼裂片披针形,长2.5毫米,顶部渐尖;花冠最初坛状,开花后钟状,绿白色,长3.5—4毫米,裂片卵形,渐尖,顶部反折;雄蕊10枚,与花冠近等长,花丝内弯,长约2毫米,被短毛,药室背部有2距,药管长约为药室的1.5倍。浆果为不完全的10室,直径5毫米,成熟时暗蓝色,被白粉;果梗长4—5毫米。花期3—5月。

产海南。生于中海拔至高海拔地区的丛林中或林中石上。模式标本采自五指山。越南(北部)也有。

本种以其叶片卵形或阔卵形,顶部尾尖,基部沿叶柄稍下延,枝条及花序轴均较粗壮而易于识别。

19. 草莓树状越桔

Vaccinium arbutoides C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3:453. 1882; Sleumer in Bot. Jahrb. 71(4): 446. 1941.

常绿灌木,高60—100厘米,附生;分枝少,枝条稍粗壮,紫褐色,无毛,散生皮孔。叶散生,叶片革质,长圆形或椭圆形,长8—13厘米,宽3—5厘米,顶端短尾尖,基部宽楔形,边缘全缘,有狭窄的软骨质边,近叶柄顶部有2腺体,背面密生腺状短毛,侧脉7—8对,至



1—3. 蓝果越桔 *Vaccinium chunii* Merr. ex Sleumer: 1. 果枝, 2. 花外形放大, 3. 去花冠的花(放大示柱头)。4—7. 凸脉越桔 *Vaccinium supracostatum* Hand. -Mazz.: 4. 花枝, 5. 花外形, 6. 雄蕊背面观, 7. 雄蕊侧面观。(肖溶绘)