

长6—8毫米,被缘毛,小苞片线形,长约4毫米,早落;花梗长2—5毫米,无毛;萼筒无毛,萼齿三角形,长1—1.5毫米,无毛;花冠淡红色或淡黄绿色微带红色,坛状或钟状,长4—5毫米;雄蕊10,稍露出,花丝短,扁平,长约1毫米,近无毛或有微毛,药室背部有2上举的距,药管长约为药室的1.5—2倍。浆果球形,熟时紫黑色,直径4—6毫米。花期5—7月,果期6—9月。

产四川中、南部,云南东北部。通常生于以壳斗科植物为主的常绿阔叶林下或灌丛中,海拔750—2000米。模式标本采自四川峨眉山。

23b. 毛序红花越桔(云南植物研究)(变种)

var. pubescens C.Y. Wu et R.C. Fang in Act. Bot. Yunn. 9: 384. 1987.

与原变种不同在于序轴、果梗以至浆果外面密被短柔毛;序轴长5—9厘米。

产云南东北部。生于海拔1650—1800米的山谷阔叶林中或林中岩石上,有时附生树上。模式标本采自大关。

24. 泡泡叶越桔(中国高等植物图鉴) 图版26: 2—3

Vaccinium bullatum (Dop) Sleumer in Bot. Jahrb. 71(4): 446. 1941; 中国高等植物图鉴 3: 202. 1974, p. p., excl. specim. Yunn. — *Agapetes bullata* Dop in Lect. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 700. 1930.

常绿灌木,高2米;分枝少。枝条细长,有棱,幼枝密被微柔毛,老枝无毛,覆有多数圆形或椭圆形的褐色皮孔。叶散生,叶片革质,卵形或长卵形,长9—16厘米,宽5—8厘米,顶端渐尖或锐尖,基部圆形,边缘全缘,略反卷,两面近于无毛或幼时背面中脉基部有微毛,侧脉7—8对,近边缘网结,与中脉、网脉在表面明显下陷,在背面明显隆起,致使两面凹凸不平;叶柄粗壮,长1—2毫米,腹面无凹槽,被微柔毛。总状花序腋生,长5—8厘米;苞片三角形,长2毫米,小苞片生花梗基部;花梗被微柔毛,顶端略膨大有关节;花冠未见;花萼筒部无毛,萼齿披针形,锐尖,长3毫米,被微柔毛。果序长约8厘米,序轴有细棱,被微毛;果梗长6—9毫米,被微毛;幼果球形,直径6毫米。果期9月。

产广西西部(靖西)。生于石山林内。分布于越南(模式产地)。

描述依据了高锡朋55776号标本及 P. Dop 的原始记载。《中国高等植物植物图鉴》对本种的描述及附图看来均系云南东南部所产的拟泡叶乌饭 *V. pseudobullatum* Fang et Z. H. Pan, 而非本种。

组2. 南烛组——Sect. Bracteata Nakai, Trees and Shrubs Japan ed. 2.234. 1927.

常绿灌木或小乔木,地生或附生。叶中等大小,边缘有圆钝齿或锯齿,表面常有光泽,叶脉稍微突起或平坦不显。总状花序腋生,序轴伸长,通常有久存的苞片;花梗与萼筒间有关节;花冠筒状或坛状,外面被毛或不被毛;花药背部无距或有短距。浆果假10室。

约42种,主产热带东南亚,南至南太平洋的新赫布里底群岛,北经越南、缅甸、中国西