

南、华南、华东,达琉球群岛及小笠原群岛,西至印度(南部)。我国7种,主产华东、华南,仅少数分布至西南。

本组模式种: 南烛 *V. bracteatum* Thunb.

25. 峦大越桔(台湾植物志) 图版 27: 4—5

Vaccinium randaiense Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo **30**(1): 168. 1911; Kanehira, Form. Trees rev. ed. 555. f. 515. 1936; H. L. Li, Woody Fl. Taiw. 706. 1963; 台湾植物志 **4**: 44. 1978. — *V. hancockiae* Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. **13**: 152. 1918; Sleumer in Bot. Jahrb. **71**(4): 469. 1941. — *V. bracteatum* Thunb. var. *lanceolatum* Nakai, Trees and Shrubs Japan ed. 2. 243. 1927; Sleumer in Bot. Jahrb. **71**(4): 474. 1941.

常绿灌木,高3—6米;茎多分枝,枝细长,幼枝近圆柱形,有细棱,灰褐色,无毛,老枝暗褐色,圆柱形。叶片革质,披针状菱形、长圆状披针形或披针形,长3—7厘米,宽1.5—2厘米,顶端渐尖,基部宽楔形,边缘有明显或不明显的疏、浅齿,稀近全缘,两面无毛,表面有光泽,侧脉纤细,5—6对,与中脉、网脉在表面略显,在背面稍微突起;叶柄长4—8毫米,无毛。花未见。果序总状,腋生和顶生,序轴长3—4.5厘米,细长,略具棱,无毛;果梗长2毫米;浆果球形,直径约5毫米,成熟后紫黑色,无毛。果期10—11月。

产台湾、湖南(新宁)、广东北部、广西东北至西南、贵州(清镇)。生于山地林内或林缘。模式标本采自台湾峦大山。分布于日本琉球。

未见到本种的模式标本或台湾标本。描述系据大陆所产标本。据李惠林在《台湾植物志》中记载,中国台湾和日本琉球所产具薄而狭的披针形叶,花萼和花冠无毛,此重要特征与湖南、广东、广西、贵州的植物无异,其他特征也很一致。

26. 镰叶越桔 白花乌板紫(广西) 图版 28:4—6

Vaccinium subfalcatum Merr. ex Sleumer in Bot. Jahrb. **71**(4): 475. 1941.

常绿灌木,高2—5米,或为小乔木,高达6.5米;枝条纤细,幼枝近圆柱形,有细棱,淡褐色,无毛,老枝灰褐色。叶片薄革质,狭披针形或长椭圆状披针形,长4—11厘米,宽1—2厘米,顶端长渐尖或略呈镰状,基部楔形渐狭,边缘有锯齿,齿端胼胝体状,两面无毛,中脉纤细,在表面略微突起,在背面明显突起,侧脉纤细,在表面不显,在背面连同网脉略显;叶柄长2—3毫米,无毛。总状花序腋生和顶生,长4—6厘米,序轴细,左右曲折,有棱,无毛;花梗长4—6毫米,无毛,与萼筒间明显有关节;苞片着生花梗基部,果成熟时脱落,狭卵状披针形或长圆状披针形,渐尖,长8—15毫米,宽2.5毫米,边缘有极短的具腺缘毛,小苞片着生花梗中部,钻形,长2毫米,花后即脱落;萼筒密被短柔毛,萼齿狭三角形,锐尖,长2毫米,无毛或被微毛;花冠白色,芳香,筒状,花冠管长约8毫米,径约2.5毫米,外面被短柔毛,顶端裂片短小,反折;雄蕊长约6毫米,花丝疏生微毛,基部扩大,长约3毫米,药室长不及1.2毫米,背部有2短距,药管长1.5—2毫米;花盘密被灰色短柔



1—3. 海岛越橘 *Vaccinium wrightii* Gray: 1.花枝, 2. 花, 3. 雄蕊。4—5. 密大越橘 *Vaccinium randaiense* Hayata: 4. 果枝, 5. 果。(曾孝濂绘)