

毛;花柱略伸出花冠。浆果球形,直径5—6毫米,成熟时紫黑色,被短柔毛。花期5月,果期10月。

产广东西南、广西南部。生于海拔(100—)340—860米的林内或灌丛中,有时生于多岩石的地方。模式标本采自广西上思。分布于越南(北部)。

27. 海南越桔(海南植物志) 图版 26: 1

Vaccinium hainanense Sleumer in Bot. Jahrb. **71**(4): 469. 1941; 海南植物志 3: 148. 1974。

常绿灌木;幼枝近圆柱形,略有棱,淡褐色,无毛,老枝灰褐色。叶片革质,长圆状椭圆形或倒卵形,长4—6厘米,宽2—3厘米,顶端钝圆或锐尖,基部渐狭,沿叶柄略下延,全缘或近顶端有不明显的疏齿,两面无毛,表面有光泽,侧脉5—6对,与中脉、网脉在叶面略微突起,在背面明显突起;叶柄长6—8毫米,稍粗,无翅,干后稍有皱纹。花未见。果序总状,腋生,序轴长4—6厘米,无毛而略具棱;小苞片不明显;果梗长3—5毫米;浆果球形,直径约5毫米,成熟时红色,无毛。花期3—5月,果期6—10月。

产海南。生于山顶丛林中。模式标本采自定安。

28. 海岛越桔 大叶越桔(台湾植物志) 图版 27: 1—3

Vaccinium wrightii Gray in Mem. Amer. Acad. Arts & Sci. N. S. **6**: 398. 1858—1859; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. **26**: 14. 1889, pro syn.; Shimata in Trans. Nat. Hist. Soc. Form. **8**: 87. 1918; Sleumer in Bot. Jahrb. **71**(4): 468. 1941; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 703. 1963; 台湾植物志 **4**: 45. 1978. —*V. bracteatum* Thunb. var. *wrightii* (Gray) Rehd. et Wils. in Sargent, Pl. Wils. **1**: 559. 1913. —*V. donnianum* var. *hangchouense* auct. non Matsuda: Sasaki, Cat. Govern. Herb. (Form.) 396. 1930. —*V. donnianum* auct. non Wight: Sasaki, Cat. Govern. Herb. (Form.) 396. 1930.

28a. 海岛越桔(原变种)

var. *wrightii*

常绿小乔木;幼枝无毛或疏被短柔毛。叶片厚革质,卵形、长圆形或菱状长圆形,长3—5厘米,宽1.5—2.5厘米,锐尖或渐尖,基部宽楔形至近圆形,具锯齿,两面无毛且近于同色,中脉在两面微突起,侧脉每边有3—4条,在表面不显,在背面略显;叶柄长约2毫米,粗壮,被微毛或变无毛。总状花序顶生及腋生,无毛,长7厘米;花梗长5—8毫米,略弯曲;苞片叶状,长2—5毫米,通常宿存;花萼5裂,裂片三角形,无毛;花冠钟状圆柱形,长5—7毫米,无毛,浅5裂;雄蕊10,花药具距,花丝扁平,细长,基部被疏柔毛。果球状,径约6毫米;果梗长1—1.5厘米。

产我国台湾(宜兰、花莲、台东)。通常近海岸生长,海拔600—1600米。分布日本冲绳岛、西表岛。



1. 海南越桔 *Vaccinium hainanense* Sleumer: 植株。2—3. 泡泡叶越桔 *Vaccinium bullatum* (Dop) Sleumer: 2. 植株, 3. 果放大。(张宝福绘)