

28b. 长柄海岛越桔(变种) 台湾大叶越桔(台湾植物志)

var. **formosanum** (Hayata) H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 704. 1963; 台湾植物志 4: 46. 1978. ——*V. formosanum* Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 30 (1): 167. 1911 (Mat. Fl. Form.)

常绿小灌木; 叶片长 1.5—2 厘米, 宽 1—1.5 厘米; 叶柄长 1—2 厘米; 果梗长 1—1.2 厘米。

产我国台湾(花莲、台东)。生于海拔约 1 600 米的林内。模式标本采自台东。

应绍舜于 1977 年 (in Quart. Journ. Chin. For. 10(1): 117) 对此变种作过这样的处理: *V. bracteatum* var. *formosanum* (Hayata) S. S. Ying, 限于目前未能研究台湾标本, 暂维持李惠林 1963 年的归属处理。

29. 平萼乌饭(植物分类学报) 图版 28: 1—3

Vaccinium truncatocalyx Chun ex Fang et Z. H. Pan in Act. Phytotax. Sin. 19: 112. pl. V, 4. 1981.

灌木或乔木, 高 2.6—8 米; 幼枝灰褐色, 有细棱, 无毛。叶片薄革质, 椭圆形或长圆状椭圆形, 长 3—5 厘米, 宽 1.2—1.5 厘米, 顶端渐尖, 基部宽楔形, 边缘具疏而浅的锯齿, 中脉在表面微凸, 在背面突起, 侧脉 5—6 对, 在两面稍微突起, 网脉在叶面不显, 在背面显著; 叶柄长 3—4 毫米, 无毛。总状花序顶生和腋生, 长 1.5—2 厘米, 序轴密被短柔毛; 苞片早落, 小苞片极小, 着生花梗基部, 三角状披针形, 早落; 花梗长 1.5—2 毫米, 密被短柔毛; 萼筒外密被短柔毛, 花萼口部截平形; 萼齿不发育; 花冠紫红色, 筒状坛形, 长 4.5—5 毫米, 外面密被短柔毛, 内面有疏柔毛, 口部裂片短小, 三角形, 外反; 雄蕊内藏, 与花冠近等长, 花丝细长, 长 2 毫米, 密被柔毛, 药室背部无距, 药管长相当于药室的 3 倍; 花盘密生短毛。果实未见。花期 7 月。

产广东。生于林内。模式标本采自信宜境内。

30. 南烛(开宝本草、植物名实图考) 染菽(古名), 乌饭树(江苏、浙江、江西), 米饭树、乌饭叶、康菊紫(浙江)、饭筒树、乌饭子、零丁子、大禾子(江西), 称杆树、米碎子木(广西), 苞越桔(江苏植物名录), 米饭花(台湾植物志)

Vaccinium bracteatum Thunb. Fl. Jap. 156. 1784; Don, Gen. Syst. 3: 854. 1834; Dunal in DC. Prodr. 7: 573. 1839; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris Ser. 2, 6 (Pl. David I: 195): 75. 1883; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 14. 1889; Rehd. et Wils. in Sargent, Pl. Wils. 1: 558. 1913; Lév. Fl. Kouy-Tchéou 154. 1914; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 142. 1927; Dop in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 710. 1930; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 282. 1934; Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7: 796. 1936; Chen, Ill. Man. 967. f. 857. 1937; Sleumer in Bot. Jahrb. 71(4): 470. 1941; 陈嵘, 中国树木分类学 967. 图 857. 1953; Ohwi, Fl. Jap. 906. 1953; H.



1—3. 平萼越桔 *Vaccinium truncatocalyx* Chun ex Fang et Z. H. Pan: 1. 花枝, 2. 花外形, 3. 雄蕊。4—6. 镰叶越桔 *Vaccinium subfalcatum* Merr. ex Sleumer: 4. 花枝, 5. 花外形, 6. 雄蕊。(李锦畴绘)