

中、灌丛中。模式标本采自湖南。

Hand. -Mazz. (1936) 对本变种作过描述, 译录于下: 叶比原变种稍厚, 通常宽椭圆形, 渐尖。总状花序长 3.5—8 厘米, 有时成复总状; 苞片草质, 披针形或宽椭圆形, 长 4—15 毫米, 通常有小锯齿, 久存; 花梗长 1—4 毫米; 花冠长 8—11 毫米, 裂片极短; 花药管极纤细, 长 4 毫米。

38. 刺毛越桔(中国高等植物图鉴) 图版 30: 1—2

Vaccinium trichocladum Merr. et Metc. in Lingnan Sci. Journ. 16: 174, fig. 11. 1937; Sleumer in Bot. Jahrb. 71(4): 457. 1941; 中国高等植物图鉴 3: 207. 图 4367. 1974. — *V. iteophyllum* Hance var. *hispidum* Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7(4): 796. 1936.

38a. 刺毛越桔(原变种)

var. **trichocladum**

常绿灌木, 有时乔木状, 高 3—8 米; 幼枝具细棱, 密被具腺长刚毛和短糙毛, 老枝圆柱形, 渐变无毛。叶密生, 散生枝上, 叶片薄革质, 卵状披针形或长卵状披针形, 长 4—9 厘米, 宽 2—3 厘米, 顶端渐尖或长渐尖, 基部圆形或微呈心形, 边缘有弯而硬的刺尖状锯齿, 叶面近于无毛, 仅沿中脉密被短糙毛, 背面被短糙毛, 沿中脉并杂有具腺刚毛, 侧脉 8—10 对, 自中脉发出不远即网结, 与中脉、网脉在叶面不明显, 在背面稍突起; 叶柄长 2—4 毫米, 被毛与茎相同。总状花序腋生和顶生, 长 4—8 厘米, 序轴至花梗密被糙毛或短柔毛; 苞片长圆形, 或长圆状披针形, 长约 2.5 毫米, 边缘有具腺流苏, 小苞片着生花梗中部, 三角形, 长约 1 毫米; 花梗长 3—4 毫米; 萼筒通常被毛, 萼齿三角状卵形, 长约 1 毫米, 无毛; 花冠白色, 筒状坛形, 长 5—6 毫米, 无毛, 浅裂, 裂齿反折; 雄蕊稍短于花冠, 花丝长约 1 毫米, 密被毛, 药室背部有 2 距, 药管长约为药室长的 2 倍。浆果球形, 熟时红色, 直径 5—6 毫米, 被糙毛。花期 4 月, 果期 5—9 月。

产安徽、浙江、江西、福建、广东、广西、贵州。生于山地林内, 海拔 480—700 米。模式标本采自广东翁源。

38b. 光序刺毛越桔(云南植物研究)(变种)

var. **glabriracemosum** C. Y. Wu in Act. Bot. Yunn. 9: 387. 1987.

与原变种不同在于植株被毛较少, 局部无毛, 仅幼枝通常被具腺刚毛; 花序轴、花梗、萼筒完全无毛; 苞片显著; 叶缘锯齿短浅, 有时近于全缘。

产浙江、江西、福建。模式标本采自浙江丽水。

39. 乌鸦果(中国高等植物图鉴) 土千年健、千年矮(滇南本草), 老鸦泡、老鸦果(云南)

Vaccinium fragile Franch. in Journ. de Bot. 9: 366. 1895; Rehd. et Wils. in Sargent, Pl. Wils. 1: 559. 1913; Lév. Cat. Pl. Yunn. 94. 1916; Chung in Mem.



1—2. 刺毛越桔 *Vaccinium trichoeladum* Merr. et Metc.: 1. 花枝, 2. 茎部分放大。3—4. 流苏萼越桔 *Vaccinium fimbriicalyx* Chun et Fang: 3. 花枝, 4. 花放大。(李锡畴绘)