

产江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏。生于海拔 400—1 440(—2 400) 米的山地灌丛中,或山坡疏、密林内。模式标本采自福建。

44b. 腺毛米饭花(西藏植物志)(变种)

var. *glandulosum* C. Y. Wu et R. C. Fang, 西藏植物志 **3**: 729. 1986.

此变种的特征是除花序轴密被淡褐色短柔毛外,幼枝、叶柄及叶背面沿中脉被腺头刚毛。

产我国西藏。生于海拔 2 300 米的山坡常绿林中。模式标本采自察隅县下察隅沙弯后山。

45. 细齿乌饭(植物分类学报)

Vaccinium serrulatum Fang et Z. H. Pan in Act. Phytotax. Sin. **19**: 111. pl. V, 2. 1981.

常绿灌木; 幼枝紫绿色,微呈棱角状,被微柔毛。叶片革质,宽椭圆形至长椭圆形,长 3—4.5 厘米,宽 1.3—2.5 厘米,基部圆形或宽楔形,顶端渐尖,具小尖头,边缘具密集细锯齿,齿端具前弯的小尖头,两面近于无毛,或于表面沿中脉被微毛,侧脉 6—8 对,与中脉在表面微下凹成浅沟状,在背面突起;叶柄长 4 毫米,无毛。总状花序腋生或生枝顶叶腋,长 1.5—3 厘米,序轴被淡黄色短柔毛;苞片长椭圆形,长 3 毫米;花梗长 1 毫米,被黄色柔毛;萼筒被疏毛,萼齿 5,宽三角形;花冠壶形,白色至淡红色,长 5—6 毫米,直径 2.5 毫米,被疏柔毛,裂片三角状卵形,长 1.2 毫米;雄蕊 10,花丝长 1.2—2 毫米,被淡黄色短柔毛,药室背部具 2 细小的距,药管与药室等长或略长。浆果球形,未熟,直径 3—4 毫米,无毛。花期 12 月至翌年 1 月,果期 8 月。

产四川(会理)、云南(邱北)。生于海拔 1 500 米。模式标本采自云南丘北。

本种与毛萼越桔 *V. pubicalyx* Franch. 相近,其区别在于本种的幼枝被微柔毛,叶宽椭圆形或长椭圆形,较宽,叶脉显著下陷或成浅沟状;花冠较长,长 5—6 毫米。

46. 毛萼越桔(中国高等植物图鉴)

Vaccinium pubicalyx Franch. in Journ. de Bot. **9**: 369. 1895; Lév. Cat. Pl. Yunnan 94. 1916; Chung in Mem. Sci. Soc. China **1**: 202. 1924; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **15**: 285. 1934; Hand. -Mazz. Symb. Sin. **7**(4): 796. 1936; Sleumer in Bot. Jahrb. **71**(4): 457. 1941; 中国高等植物图鉴 **3**: 207. 图 4368. 1974; Chamberl. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **35**(2): 255. 1977. — *V. spicigerum* W. W. Smith in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **9**: 135. 1916 — *Myrica mairei* Lév. in Bull. Acad. Géogr. Bot. **25**: 40. 1915, Cat. Pl. Yunnan 177. 1916.

46a. 毛萼越桔(原变种)

var. *pubicalyx*

常绿灌木或小乔木,高 1—4 米; 幼枝被浅黄褐色短绒毛,老枝无毛,灰色或灰褐色。