

## 47. 广东乌饭(植物分类学报) 图版 29: 1

**Vaccinium guangdongense** Fang et Z. H. Pan in Act. Phytotax. Sin. **19**: 112. pl. V, 3. 1981.

常绿乔木, 高 6 米; 树皮灰褐色; 幼枝紫绿色, 略具棱, 无毛。叶散生, 叶片革质, 椭圆形或椭圆状披针形, 长 3.5—4.2 厘米, 宽 1.2—1.6 厘米, 顶端渐尖或锐尖, 基部楔形, 边缘具钝锯齿, 两面无毛, 中脉在表面平坦, 在背面凸起, 侧脉 4—6 对, 纤细, 在表面不显, 在背面与网脉均凸起; 叶柄长 2.5—3 毫米, 近于无毛。花未见。果序总状, 顶生和腋生, 长 3.5—4.5 厘米, 序轴具棱, 被微毛; 果梗长 3—3.5 毫米, 被微毛, 顶端与果实间有关节; 幼果球形, 密被短柔毛, 顶部花盘部密被淡黄色柔毛; 宿存萼齿三角形, 长 1 毫米或更短, 密被毛。果期 6 月以后。

产广东。生于海拔 890 米左右的山地密林中。模式标本采自阳春。

## 48. 隐距越桔

**Vaccinium exaristatum** Kurz in Journ. As. Soc. Beng. 42. 1873, pt. II. 86. 1977; id. For. Fl. Brit. Burma 2:91. 1877; Forbes. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **28**: 81. 1890; Craib in Kew Bull. 404. 1911; Dop in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine **3**: 711. 1930; Fletch. in Craib, Fl. Siam. Enum. **2**: 312. 1938.—*V. exaristatum* Kurz var. *pubescens* Kurz in Journ. As. Soc. Beng. 46. 1877, pt. II. 215. 1877—*V. bancanum* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. India **3**: 454. 1882, p. p. non Miquel—*V. longitubulosum* J. J. Smith in Meded. Herb. Leiden n. 30, 5. 1916, fig. 3.—*V. sprengelii* Sleumer in Bot. Jahrb. **71**(4): 460. 1941, p. p.—*V. iteophyllum* auct. non Hance: Rehd. et Wils. in Sargent, Pl. Wils. **1**:558. 1913, p. p. quoad specim. Yunn.; Sleumer in Bot. Jahrb. **71**(4): 458. 1941, p. p. quoad Henry 11648, 11648a

常绿小乔木, 高 3—5(—14) 米, 有时成灌木状, 高 1—4 米; 幼枝密被短柔毛, 老枝灰褐色, 无毛。叶片革质, 椭圆形, 长圆状卵形或长圆状披针形, 长 3—7.5 厘米, 宽 2—3 厘米, 顶端锐尖或渐尖, 基部楔形或钝圆, 边缘有锯齿, 干后叶片淡黄褐色或黄白色, 两面沿中脉被短柔毛尤以背面明显, 背面被毛或无毛, 叶脉在两面稍微突起; 叶柄长 2—3 毫米, 密被短柔毛。总状花序腋生和生枝顶叶腋, 长 3—10 厘米, 序轴通常被短柔毛, 有时无毛; 苞片卵形或宽卵形, 先端渐尖, 长 2.5—3 毫米, 早落, 小苞片 2, 着生花梗基部, 披针形, 长 1—1.5 毫米, 早落; 花梗长 1—3.5 毫米, 无毛或被短柔毛; 萼筒无毛或被毛, 萼齿短小, 三角形或半圆形, 外面无毛, 有时边缘密被短纤毛; 花冠淡红色, 筒状, 长 6—8 毫米, 裂齿短小, 三角形或长圆形, 直立或反折; 雄蕊内藏, 药室背部无距, 或有短小近于退化的距, 药管为药室长的 2—3 倍, 花丝被疏柔毛; 花柱不伸出花冠或略为伸出。浆果球形, 直径 4—5 毫米, 成熟时红色或紫黑色。花期 3—4 月, 果期 5—6 月。



1. 广东乌饭 *Vaccinium guangdongense* Fang et Z. H. Pan: 幼果果枝。2—5. 瑶山越橘 *Vaccinium yaoshanicum* Sleumer: 2. 花枝, 3. 花外形放大。4. 雄蕊正面观, 5. 雄蕊背面观。(肖溶绘)