

已知 10 种,分布限于东喜马拉雅。我国有 9 种,分布云南西北部、西藏东南部。

本组模式种: 小轮叶越桔 *V. vacciniaceum* (Roxb.) Sleumer

50. 红梗越桔

Vaccinium ardisioides Hook. f. ex C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 452. 1882; Sleumer in Bot. Jahrb. **71**(4): 477. 1941.

常绿灌木,有时附生,高 1—2 米;全株无毛。幼枝光滑,无明显的皮孔。叶 6—7 片假轮生,叶片坚纸质,椭圆形,长圆形或长圆状披针形,长 8—12 厘米,宽 2.7—4 厘米,顶端渐尖,基部变狭,略呈心形,全缘,侧脉纤细,多数,与中脉、网脉在两面略微突起;叶柄近无。花序 1—3 枝发自叶腋,总状,长 7—12 厘米,有多数花,偏向一侧;苞片和小苞片早落;花梗棒状,长 1.5 厘米,上部增粗,与萼筒间明显有关节;萼筒短柱状,5 裂,裂片 1/2 以下连合,裂齿三角形,长约 1 毫米;花冠淡红色或桔红色,筒状,长 7.5—8 毫米,顶端 5 裂,裂齿短小;雄蕊比花冠短,长约 6 毫米,花丝长 2.5 毫米,无毛或被微毛,药室背部有 2 短小的距,药管与药室近等长。成熟果未见,幼果球形,鲜红色,直径 6 毫米;果梗增粗,红色,长 2.2 厘米。花期 3 月,果期 5 月。

产云南(潞西、耿马、西盟)。生于路旁或密林中湿润处,有时附生林中树上,海拔 2 000—2 150 米。分布缅甸。

51. 轮生叶越桔(中国高等植物图鉴) 图版 31: 4—6

Vaccinium venosum Wight, Icon. Pl. 4. t. 1185. 1848; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 452. 1882; Sleumer in Bot. Jahrb. **71**(4): 477. 1941; 中国高等植物图鉴 **3**: 209. 图 4372. 1974. ——*Epigynium venosum* (Wight) Klotzsch in Linnaea **24**: 50. 1851.

常绿灌木,附生,高约 0.6 米;幼枝有棱,被短柔毛或近于无毛,疏被宿存叶芽鳞,芽鳞长圆状披针形,长约 3 毫米,老枝茎皮粗糙。叶 5—6 片假轮生,叶片革质,长圆形至长圆状披针形,长 6—10 厘米,宽 2—3.5 厘米,先端渐尖,基部宽楔形,略钝,边缘具粗齿,两面无毛,干后表面暗绿或黑绿色,背面褐黄色,叶脉在表面凹陷,在背面突起,侧脉 10 对以上,表面因侧脉、网脉明显凹陷而呈泡状隆起;叶柄粗短或近于无。总状花序生枝顶叶腋,长 3.5—4 厘米,基部被覆瓦状排列的花芽鳞,芽鳞三角状披针形,长 3—5 毫米;苞片未见,小苞片生花梗基部,线形,长约 2 毫米,无毛,早落;花梗长 2—2.5 毫米,无毛,向上增粗,与萼筒间明显有关节;萼筒无毛,表面有圆形小瘤,萼齿三角形,长约 1 毫米,有 1 条脉,无毛;花冠颜色不详,筒状坛形,长 4—5 毫米,外面无毛,内面上部被疏毛,口部 5 裂,裂齿短小;雄蕊 10,比花冠略短,花丝长 2 毫米,无毛,扁平,中部以下明显扩大,药室长 1.5 毫米,背部无距,药管与药室近等长;花柱与花冠近等长。果实未见。花期 12 月至翌年 1 月。

产我国西藏(墨脱)。生于海拔 1 400 米的江边岩石上。分布不丹、印度(东北部)。