

骨质边,在叶片基部两侧各有1腺体,表面有光泽,除沿中脉被微柔毛外,其余无毛,背面散生贴伏的刚毛,中脉在表面突起,在背面平坦,侧脉和网脉在表面略显,在背面不明显;叶柄长约2毫米,初时被短柔毛,渐变无毛。花未见。果序腋生,总状,长1.2—2厘米,着生3个果,序轴无毛;苞片和小苞片早落;果近球形,未成熟时绿色,无毛,宿存萼片三角状披针形,长2.5—3毫米,无毛;果梗长约7毫米,无毛。果期6月。

产广东西北部。生于山地疏林,海拔1200米,模式标本采自封开。

本种相近于广西越桔 *V. sinicum* Sleumer, 但叶片较大,顶端锐尖,背面伏生短刚毛而不同。

62. 贝叶越桔(中国高等植物图鉴) 图版 33: 1—3

*Vaccinium conchophyllum* Rehd. in Journ. Arn. Arb. 11: 167. 1930; Sleumer in Bot. Jahrb. 71(4): 440. 1941; 中国高等植物图鉴 3: 201. 图 4355. 1974.

常绿灌木,半匍匐状,高20—30厘米;枝条幼时被短而开展的疏柔毛,褐色,老枝变无毛,灰色。叶片厚革质,极为密生,宽卵形或宽倒卵形,长8—14毫米,宽6—9毫米,顶端圆形,基部宽楔形至圆形,边缘全缘,反卷,幼时被缘毛,以后无毛,幼叶表面被疏柔毛,不久除中脉有毛外其余变无毛,有网状绉纹,背面平滑,淡绿色,无毛,中脉在表面凹陷,向基部稍突起,在背面几不隆起,侧脉3—4对,在表面凹陷,在背面不明显;叶柄长1—2毫米。总状花序腋生,4—6花;序轴无毛;苞片长圆形,较花梗长,无毛,早落;花梗长1—2毫米,无毛;萼筒部无毛,萼裂片三角状卵形,锐尖,长1.5毫米,无毛;花冠红色,卵状坛形,长5毫米,裂片很短,三角形,反折;雄蕊花丝宽,长2毫米,有疏柔毛,药室背部有2距,其长度相当于药管的1/2。浆果扁球形,熟时淡绿色,略有白粉。花期4—5月,果期8—9月。

产四川(南川、洪雅)。生于林中岩石上或树干上,海拔1320—2750米。模式标本采自南川金佛山。

63. 广西越桔(中国高等植物图鉴) 路边针(广西) 图版 34: 3—5

*Vaccinium sinicum* Sleumer in Bot. Jahrb. 71(4): 440. 1941; 中国高等植物图鉴 3: 201, 图 4356. 1974.

常绿小灌木,高0.4—2米。分枝多,幼枝褐色有棱,被开展的短柔毛,老枝灰色,无毛。叶密集,叶片革质,倒卵形或长圆状倒卵形,长0.9—1.7厘米,宽0.8—1.1厘米,顶端圆形,微突尖,不凹缺,基部楔形,边缘全缘,反卷,每侧近叶片基部有1腺体,表面稍拱凸,除中脉被微毛外其余无毛,背面无毛,中脉在两面突起,侧脉在两面不显;叶柄很短,长1—2毫米。总状花序腋生,很短,开花前覆以数枚长圆形的芽鳞,鳞片长6—7毫米,早落,有3—7朵花,花序轴长0.6—1.2厘米,有毛或近于无毛;花梗长2—3毫米,无毛;花萼裂片短三角形,钝头,长1.5—2毫米,无毛;花冠坛状,白色或淡黄绿色,长约5毫米,外面无毛,内面上部被微毛,口部短5裂,裂片极短小;雄蕊10,花丝长约2毫米,被微毛或近无



1—3. 贝叶越桔 *Vaccinium conchophyllum* Rehd.: 1. 果枝, 2. 叶片, 3. 茎的一段。4. 峨眉越桔 *Vaccinium omeiense* Fang: 果枝。(张宝福绘)