

毛,花药背部有2伸展的距,药管长约为药室的1.5倍。浆果近球形,直径约9毫米,熟时紫黑色。花期6月,果期7—11月。

产湖南、广东、广西。生于林中、山谷石上或附生于壳斗科植物树干上,海拔1200—1700米。模式标本采自广西全州。

64. 短梗乌饭(植物分类学报)

Vaccinium brevipedicellatum C. Y. Wu ex Fang et Z. H. Pan in Act. Phytotax. Sin. **19**: 107. pl. IV, 1. 1981; P. F. Stevens in Journ. Arn. Arb. **66**: 488. 1985. — *Agaperes chapaensis* Dop in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine **3**: 702. 1930, incl. var. *oblonga* Dop in l.c. 703. 1930, non *Vaccinium chapaense* Merr. (1938)

常绿灌木,高1—3米,稀乔木,高8米;分枝多,枝条有棱,幼时密被污黄色短柔毛,以后无毛。叶密生,叶片革质,椭圆形,长1.5—2.3(—3)厘米,宽0.8—1.2厘米,顶端短渐尖而钝头,不凹缺,基部楔形或宽楔形,边缘全缘,反卷,两面无毛,或表面沿中脉被短柔毛,表面稍拱凸,干后多横向的绉纹,中脉在两面突起,侧脉1—2对,极不明显,有时在表面微突,在背面尤不明显;叶柄短,长2毫米,被短柔毛,花1—2(—3)朵簇生叶腋;花梗粗短,长约1毫米,被褐色短柔毛;萼筒无毛,萼片5,三角状披针形,长约1.5毫米,无毛;花冠淡绿色,钟状,长3—3.5毫米,裂片宽三角形,顶端反折,外面无毛,内面被微毛;雄蕊与花冠近等长,花丝长约1毫米,被柔毛,药室长约1毫米,背部有2短距,药管与药室近等长。浆果球形,红色,熟时黑色,直径4—5毫米;果梗粗而短,长1—2毫米,无毛。花期5月,果期6—11月。

产云南东南部。生于石灰岩山混交林下,海拔1000—1600米。模式标本采自麻栗坡。

在 P. F. Stevens 的讨论中,认为这个种在属内的系统位置尚不能确定。但本种叶形小,全缘,表面拱凸,干后多横向皱纹,花冠钟状,花药背部有距等特征,置于贝叶组内是较为合理的。

65. 长萼越桔

Vaccinium craspedotum Sleumer in Bot. Jahrb. **71**(4): 439. 1941.

65a. 长萼越桔(原变种)

var. **craspedotum**

常绿小灌木,通常附生,高0.5—1.2米;幼枝圆柱状,褐色,密被淡黄褐色开展的糙硬毛,老枝灰褐色,无毛。叶密生,革质,卵形,长1.3—2.4厘米,宽0.8—1.4厘米,叶片下部宽,向上渐变狭,顶端钝,凹缺,基部圆形,有时宽楔形,全缘,两面近于无毛;叶柄很短,长约1毫米,被毛与茎相同。花序腋生,有1—3朵花,花序轴极短,长约1毫米,基部覆以数枚卵形鳞片,苞片长约3毫米;花梗长5—6毫米,连同花萼密被淡黄褐色开展的糙硬毛,基部着生2枚长卵状披针形、长约2毫米的小苞片;萼齿披针状钻形,长4—5毫米,被疏毛;花冠初时圆柱形,一侧稍膨胀,开花时近于钟状,长约4毫米,外面疏被微柔毛至近