

1—2 毫米,被疏柔毛,以后变无毛。花单生或 2—4 朵成短总状,腋生,序轴极短,长 5 毫米或更短;花梗长 3—5 毫米,被微毛或近于无毛;苞片 2—3 对,卵形或卵状三角形,长约 1 毫米,有少数缘毛;小苞片 2 枚,着生花梗下部,特征同苞片;萼筒无毛,萼裂片 5,三角状卵形,长 1.5—2 毫米,边缘被短纤毛;花冠钟状,白色或乳白色,有淡红色脉纹,长 5—6 毫米;雄蕊花丝略被毛,花药背部有 2 短距,药管长于药室 2 倍。果球形,直径约 6 毫米。花期 5 月,果期 11 月。

产四川峨眉。生于灌丛中,海拔 1 200 米。合模式标本采自峨眉山方方地、苏岗等地。已出版的书籍中记述本种花序伞房状,实为短总状;也未指出该种叶顶端微凹。

69b. 毛萼珍珠树(变种) 四川越桔(云南植物研究)

var. *pilosum* C. Y. Wu in Act. Bot. Yunn. 9: 393. 1987. — *V. chengae* auct. non Fang: 中国高等植物图鉴 3: 200. 1974, p. p.

与原变种不同的是花梗以至花萼均密被长柔毛。

产四川(峨眉山、洪雅、雷波)。生于山坡岩石上,有时附生树上,海拔 1 000—1 600 米,模式标本采自峨眉山黄泥岗。

70. 石生越桔 图版 34: 1—2

*Vaccinium saxicola* Chun ex Sleumer in Bot. Jahrb. 71(4): 439. 1941, “saxicolum”.

常绿小灌木,高 13—17 厘米,茎下部平卧。枝条近圆柱形,褐色,幼枝被短柔毛,老枝无毛。叶密生,叶片厚革质,长圆状倒卵形,长 1.9—2.4 厘米,宽 1—1.3 厘米,顶端微凹缺,基部楔形或宽楔形,边缘全缘,反卷,两面无毛,中脉在表面下陷,在背面突起,侧脉在表面略微下陷,在背面近于平坦或略微突起;叶柄长 1—2 毫米,无毛。花腋生,单一或通常 2 朵;苞片和小苞片相似,卵形,锐尖,长 1—1.2 毫米,无毛;总花梗长 4—5 毫米;花梗长约 5 毫米,无毛,上部增粗;萼筒外疏被短柔毛,裂片 5,三角形,长约 2 毫米,外面疏被短柔毛;花冠钟状,白色,长 6—7 毫米,檐部短 5 裂;雄蕊 10,长约 7 毫米,花丝明显被开展的微柔毛,药室背部明显有 2 距,药管细长,长 4 毫米。浆果球形,幼时绿色;果梗长达 8—9 毫米。花期 3—4 月,果期 5 月以后。

产广东。生于石上。模式标本采自信宜。

71. 三花越桔

*Vaccinium triflorum* Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 287. 1934; Sleumer in Bot. Jahrb. 71(4): 438. 1941; Chamberl. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 35(2): 256. 1977. — *Pieris buxifolia* Lév. et Van. in Bull. Soc. Bot. France 53: 203. 1906, et in Fedde, Repert. Sp. Nov. 3: 262. 1907. — *Vaccinium buxifolium* (Lév. et Van.) Lév. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 12: 101. 1913, Fl. Kouy-Tchéou 154. 1914, non Hook. f. (1852)