

436. 1941; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 702. 1963; 中国高等植物图鉴 3: 199. 图 4352. 1974; 台湾植物志 4: 44. 1978. —*Agapetes merrilliana* (Hayata) Nakai in Journ. Jap. Bot. 12: 377. 1936. —*Vaccinium vitis-idaea* Linn. var. *merrillianum* (Hayata) S. S. Ying in Quart. Journ. Chin. For. 10(1): 113. 1977.

与原亚种不同在于花丝被倒向的疏柔毛。花期 4 月。

产我国台湾(阿里山、玉山、宜兰太平山)。海拔 2 000—3 730 米。

77. 抱石越桔(中国高等植物图鉴)

Vaccinium nummularia Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 451. 1882; Sleumer in Bot. Jahrb. 71(4): 431. 1941; Hara, Fl. E. Himal. 241. 1966; 中国高等植物图鉴 3: 196. 图 4345. 1974; 西藏植物志 3: 724. 图 287: 1—5. 1986.

77a. 抱石越桔(原变种)

var. ***nummularia***

常绿灌木,有时附生,高 50—70 厘米;茎披散,多分枝,幼枝被灰白色短柔毛及密被褐色开展的具腺长刚毛,老枝渐无毛,灰色,粗糙。叶密生,叶片革质,卵形或卵状圆形,长 1—1.8 厘米,宽 0.8—1.2 厘米,两端圆形,边缘反卷,有软骨质狭边,具疏、浅锯齿,齿端有具腺尖头,近基部两侧各有 1—2 个腺体,表面沿中脉被微毛,其余两面无毛,中脉、侧脉和网脉在表面明显下陷,在背面稍突起,但网脉在背面不显;叶柄长约 1 毫米,被短柔毛。总状花序顶生和枝顶叶腋生,长 1.5 厘米;序轴密被短柔毛;苞片宽卵形,长约 4 毫米,早落;花梗长 6—7 毫米,无毛;萼筒无毛,萼齿宽三角形或波状圆齿,长约 1 毫米,基部连合,边缘有短纤毛;花冠白色,上部粉红色,坛状,长 5—6 毫米,檐部裂片短小,直立或稍反折;雄蕊比花冠短,长约 4 毫米,花丝扁平,基部变宽,长约 2 毫米,密被疏柔毛,药室背部有 2 伸展的距,药管与药室近等长;子房无毛。浆果球形,直径 5 毫米,成熟时紫红转黑。花期 5 月,果期 7—8 月。

产我国西藏东南部。生于海拔 2 900—3 500 米的林下岩石上或生小坡灌丛中。分布锡金、不丹、印度(东北部)。

77b. 长叶抱石越桔(西藏植物志)(变种)

var. ***oblongifolium*** R. C. Fang, 西藏植物志 3: 724. 1986.

与抱石越桔不同在于叶片较大,长圆形、长椭圆形或长卵形,长 1.6—2.3 厘米,宽 0.7—1.2 厘米,薄革质。果期 6 月。

产我国西藏亚东。生于岩石上,海拔 2 750 米。模式标本采自亚东阿桑桥。

78. 团叶越桔(中国高等植物图鉴)

Vaccinium chaetothrix Sleumer in Bot. Jahrb. 71(4): 432. 1941; 中国高等植物图鉴 3: 196, in nota. 1974; 西藏植物志 3: 726. 1986. —*Vaccinium nummularia*