

生枝上,幼叶有时带红色,叶片纸质,卵形,长卵形或卵状披针形,长(1.5—)2—6厘米,宽0.7—2厘米,顶端锐尖、渐尖或有时长渐尖,中部以下变宽,基部宽楔形,略钝至近于平截,边缘有细锯齿,齿尖有具腺短芒,表面无毛或偶有短柔毛,背面近无毛或中脉向基部有短柔毛,中脉、侧脉纤细,在叶面不显,在背面稍突起;叶柄很短,长1—2毫米,无毛或背部被短柔毛。花单生叶腋,下垂;花梗纤细,长5—8毫米,无毛,顶部与萼筒间无关节;小苞片2,着生花梗基部,披针形,长2—4毫米,无毛;萼筒部无毛,萼裂片4,三角形,长1—1.5毫米,顶端突尖,基部连合;花冠白色,有时带淡红色,未开放时筒状,长0.8—1厘米,4深裂至下部1/4,裂片线状披针形,花开后向外反卷,花冠管长为萼裂片的2倍;雄蕊8枚,长约9毫米,花丝扁平,长1—2毫米,或疏或密被疏柔毛,药室背部无距,药管与药室等长。浆果直径约5毫米,绿色,成熟后转红色。花期6月,果期9—10月。

产长江以南各省区:安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南东北部。生于山坡林下或山坡灌丛中,海拔1000—1600(—1900)米。模式标本采自湖北西部。

本变种与原变种日本扁枝越桔的区别甚微。原变种花冠管状,长9—10毫米;花梗长8—12—20毫米;叶片长圆形或卵状长圆形或宽椭圆形,基部宽楔形或近心形,叶背面无毛。

91c. 台湾扁枝越桔(中国高等植物图鉴)(变种) 毛蕊花(台湾植物志)

var. *lasiostemon* Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 30(1): 499. 1911; id. Icon. Pl. Form. 2: 115. pl. 12. 1912; Sleumer in Bot. Jahrb. 71(4): 490. 1941; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 700. fig. 290. 1963 (sphalmate ut "*V. bracteatum*" et fig. 289); 台湾植物志 4: 41. pl. 905. 1978 (sphalmate ut "*V. bracteatum*" et Pl. 907) — *Oxycoccus japonicus* (Miq.) Nakai var. *lasiostemon* (Hayata) Makino et Nemoto, Fl. Jap. ed. 1. 409. 1925. — *Hugeria japonica* (Miq.) Nakai var. *lasiostemon* (Hayata) Sasaki List Pl. Form. 320. 1928. — *H. randaiensis* Masamune in Journ. Soc. Trop. Agr. 4: 301. 1932, excl. syn. *Vaccinium randaiense* Hayata — *H. lasiostemon* (Hayata) Maekawa in Bot. Mag. Tokyo 47: 617. 1933. — *H. vaccinioides* Hara var. *lasiostemon* (Hayata) Hara in Journ. Jap. Bot. 21: 147. 1947; 中国高等植物图鉴 3: 190. 1974. — *Vaccinium japonicum* Miq. var. *ciliare* auct. non Matsumura: Hayata in Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 168. 1911.

与原变种日本扁枝越桔不同在于雄蕊的花丝被髯毛。与变种扁枝越桔的区别在于叶片较狭小,披针形或卵状披针形,基部钝至楔形,背面无毛。

产我国台湾(台北、宜兰、南投)。生于海拔2300—2600(—3000)米的高山。模式标本采自峦大山。