

Linn., Mant. Pl. ed. 2; 199. 1771——*Myrsine laeta* A. DC. in Trans. Linn. Soc. 17; 112. 1834——*Choripetalum obovatum* Benth. in Land. Journ. Bot. 1; 490. 1842——*C. benthamii* Hance in Walp., Ann. Bot. 3; 10. 1852——*Samara obovata* Benth. in Journ. Bot. Kew Miss. 4; 301. 1852——*E. obovata* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26; 62. 1889——*Ribesiodes obovatum* O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2; 403. 1891——*Rapanea linearis* auct. non Moore: Walker, l. c. 200, quoad specim. C. I. Lei 301.

20a. 酸藤子(原变种) 图版 19:4

var. *laeta*

攀援灌木或藤本, 稀小灌木, 长 1—3 米; 幼枝无毛, 老枝具皮孔。叶片坚纸质, 倒卵形或长圆状倒卵形, 顶端圆形、钝或微凹, 基部楔形, 长 3—4 厘米, 宽 1—1.5 厘米, 稀长达 7 厘米, 宽 2.5 厘米, 全缘, 两面无毛, 无腺点, 叶面中脉微凹, 背面常被薄白粉, 中脉隆起, 侧脉不明显; 叶柄长 5—8 毫米。总状花序, 腋生或侧生, 生于前年无叶枝上, 长 3—8 毫米, 被细微柔毛, 有花 3—8 朵, 基部具 1—2 轮苞片; 花梗长约 1.5 毫米, 无毛或有时被微柔毛, 小苞片钻形或长圆形, 具缘毛, 通常无腺点; 花 4 数, 长约 2 毫米, 花萼基部连合达 1/2 或 1/3, 萼片卵形或三角形, 顶端急尖, 无毛, 具腺点; 花瓣白色或带黄色, 分离, 卵形或长圆形, 顶端圆形或钝, 长约 2 毫米, 具缘毛, 外面无毛, 里面密被乳头状突起, 具腺点, 开花时强烈展开; 雄蕊在雌花中退化, 长达花瓣的 2/3, 在雄花中略超出花瓣, 基部与花瓣合生, 花丝挺直, 花药背部具腺点; 雌蕊在雄花中退化或几无, 在雌花中较花瓣略长, 子房瓶形, 无毛, 花柱细长, 柱头扁平或几成盾状。果球形, 直径约 5 毫米, 腺点不明显。花期 12 月至翌年 3 月, 果期 4—6 月。

产云南、广西、广东、江西、福建、台湾, 海拔 100—1500 (—1850) 米的山坡疏、密林下或疏林缘或开阔的草坡、灌木丛中。越南, 老挝, 泰国, 柬埔寨均有。

根、叶可散瘀止痛、收敛止泻, 治跌打肿痛、肠炎腹泻、咽喉炎、胃酸少、痛经闭经等症; 叶煎水亦作外科洗药; 嫩尖和叶可生食, 味酸; 果亦可食, 有强壮补血的功效。兽用根、叶治牛伤食腹胀、热病口渴。

20b. 腺毛酸藤子(变种)

var. *papilligera* (Nakai) Walker in Bot. Mag. Tokyo 67; 158. 1954 et Quart. Journ. Taiwan Mus. 12; 186. fig. 17. 1959; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 718. 1963——*E. penduliramula* Hayata, Icon. Pl. Form. 5; 84. t. 9. 1915——*Samara laeta* var. *papilligera* Nakai in Nakai et Honda, Nov. Fl. Jap. 9; 24. fig. 4. 1943.

本变种与前者主要区别是, 幼枝被细乳头状突起, 花梗被腺状微柔毛。

产我国台湾, 海拔 1100—2000 米的山坡疏林下或灌木丛中。