

## 3a. 狭叶毛鳞蕨 (原变种)

var. *angustifolium*

叶远生; 叶柄长 3—7 厘米, 粗约 1 厘米, 深禾秆色, 光滑。叶片带状, 宽 0.8—2.4 厘米, 长 30—60 厘米, 向两端渐狭, 长渐尖头, 基部楔形, 无翅, 边缘略呈波状。主脉两面隆起, 小脉可见。孢子囊群圆形, 在主脉两侧排成整齐的一行, 下陷于叶肉中, 在叶背面可见到明显的瘤状突起。

产云南 (贡山)、西藏 (察隅、墨脱、格林)。攀援树干上, 海拔 2500—2800 米。

## 3b. 披针毛鳞蕨 (变种) (西藏植物志)

var. *lanceolatum* (Ching et S. K. Wu) Y. X. Lin, nov. comb. ——*Tricholepidium lanceolatum* Ching et S. K. Wu in Acta Phytotax. Geobot. **29**: 5. 1978 et Fl. Xizang. **1**: 316. f. 80. 1983.

本变种与原变种不同之处, 在于叶片狭披针形, 有较长的叶柄, 叶片宽仅为 2—2.5 厘米。

产西藏 (墨脱、察隅)。附生阔叶林中树干上, 海拔 800—2180 米。

## 3c. 镰状毛鳞蕨 (变种) (新拟)

var. *falcato-lineare* Ching in Acta Phytotax. Geobot. **29**: 44. 1978.

本变种与原变种不同在于植株较小, 叶片呈线状镰刀形, 近无柄, 长约 24 厘米, 宽 8—9 毫米。

产云南西北部。

## 4. 显脉毛鳞蕨 (蕨类名词及名称)

*Tricholepidium venosum* Ching in Acta Phytotax. Geobot. **29**: 45. 1978; Shing in W. T. Wang, Vasc. Pl. Hengduan Mts. **1**: 168. 1993. ——*Tricholepidium subnudum* Ching et S. K. Wu, Fl. Xizang. **1**: 314. f. 79: 4—5. 1983. ——*Microsorium normale* (D. Don) Noot. in Blumea **42**: 341. pl. 4: 31, 11: 35. 1997.

叶远生; 叶柄长 3—6 厘米; 叶片宽带状, 宽 2.5—4 厘米, 长 40—60 厘米, 渐尖头, 向下渐狭, 以狭翅下延, 干后灰绿色, 或淡棕色, 纸质。主脉两面隆起, 侧脉粗壮, 小脉在下面明显隆起, 清晰, 呈灰白色。孢子囊群圆形, 在主脉两侧各排成一行, 大型。

产云南西北部 (贡山、龙陵)、西藏 (墨脱)。附生树干上, 海拔 1300—2000 米。模式标本采自云南贡山。

## 5. 斑点毛鳞蕨 (蕨类名词及名称)

*Tricholepidium maculosum* (Christ) Ching in Acta Phytotax. Geobot. **29**: 45. 1978. ——*Polypodium maculosum* Christ in Bull. Herb. Boiss. **6**: 872. 1898. ——*Microsorium normale* (D. Don) Ching, l. c. p. p.; Tardieu et C. Chr., Fl. Indo-Chine **7**