

(2): 479. 1941. ——*Microsorium normale* (D. Don) Noot. in *Blumea* **42**: 341. pl. 4: 31, 11: 35. 1997, p. p.

5a. 斑点毛鳞蕨 (原变种)

var. *maculosum*

叶远生; 叶柄长 5—3 厘米, 禾秆色, 光滑; 叶片通常为阔带形, 稍披针形, 长 40—60 厘米, 宽 2—3.8 厘米, 基部渐狭, 以阔翅下延, 长尾状渐尖头, 边缘平滑, 干后灰绿色或淡棕色, 纸质。主脉两面隆起, 小脉隐约可见。孢子囊群圆形, 在主脉两侧各排成不规则的一行。

产云南 (屏边、泸水、马关、绿春)、广西。附生林内树干上, 海拔 1300—2600 米。

5b. 似毛鳞蕨 (变种) (新拟)

var. *subnormale* (Alderw.) Ching in *Acta Phytotax. Geobot.* **29**: 45. 1978. ——*Pleopeltis subnormale* Alderw. in *Bull. Buit. III.* **2**: 165. 1920. ——*Polypodium subnormale* C. Chr., *Ind. Fil. Suppl. III.* 159. 1933. ——*Microsorium normale* Holttum, *Ferns Mal.* 175. 1954.

本变种与原种的不同在于分布区不同, 本变种主要分布于亚洲大陆的马来西亚及印度尼西亚。

6. 西藏毛鳞蕨 (蕨类名词及名称)

Tricholepidium tibeticum Ching et S. K. Wu in *Acta Phytotax. Geobot.* **29**: 46. 1978 et *Fl. Xizang.* **1**: 313. f. 80: 8—10, t. 8: 6—7. 1983. ——*Microsorium normale* (D. Don) Noot. in *Blumea* **42** (2). 341—342. pl. 4: 31, 11: 35. 1997, p. p.

叶远生; 叶柄长 2—2.5 厘米, 粗约 1 毫米, 禾秆色, 光滑; 叶片阔披针形, 长 16—25 厘米, 宽 2.5—4 厘米, 向两端渐变狭, 基部楔形, 下延, 长渐尖头, 干后绿色, 薄纸质或草质。主脉两面隆起, 小脉可见。孢子囊群大型, 直径约 2 毫米, 近中生, 在主脉两侧各排成有规则的一行, 在叶片上表面孢子囊群着生处平滑不突起。

产西藏东南部 (墨脱、格林)、云南 (福贡、泸水)。附生阔叶林下树干上, 可攀援到 3 米以上, 海拔 1500—1600 米。

14. 鳞果星蕨属 *Lepidomicrosorium* Ching et Shing

Ching et Shing in *Bot. Res.* **1**: 1—14. pl. 1—5. 1983; S. H. Wu et

Ching, *Fern Fam. et Gen. Chine* 519. f. 5—200. 1991.

中小型蕨类植物。根状茎如粗铁丝状, 长而横走, 攀援树干上或岩石壁上, 顶部不生叶而呈鞭状, 密被鳞片; 鳞片粗筛孔, 披针形, 边缘具细齿, 棕色或红棕色。叶疏