

41. 叶片无柄, 向基部长下延, 叶片下面底层星状毛粉状, 宿存, 成熟时呈灰色 ……

…………… 38. 绒毛石韦 *P. subfurfuracea* (Hook.) Ching

41. 叶片基部不下延, 具柄, 叶片下面底层的星状毛在成熟前早落, 叶片下面呈绿色

…………… 16. 光石韦 *P. calvata* (Baker) Ching

1. 贴生石韦 (海南植物志)

Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching in Bull. Chin. Bot. Soc. **1**: 45. 1935; Holttum Ferns Mal. **144**. f. 60. 1955; 傅书遐, 中国主要植物图说·蕨类植物门 **235**. f. 315. 1975; Ching et al. in W. Y. Chun, Fl. Hainan. **1**: 187. 1964; Tagawa in Hara, Fl. East. Himal. **497**. 1966; Fl. Fujian **1**: 235. f. 1: 222. 1982; Tagawa et K. Iwats. in Acta Phytotax. Geobot. **25**: 71. 1972 et Fl. Thailand **3**: 496. 1989; K. Iwats., Ferns F. Allies Jap. **264**. pl. 179: 4. 1992; Ic. Corm. Sin. **1**: 266. f. 532. 1972; De Vol et C. M. Kuo in H, L, Li et al., Fl. Taiwan **1**: 205. 1975 et Fl. Taiwan 2nd ed. **1**: 513. 1994; Jones et Clemesha, Austr. Ferns F. Allies **253**. f. 30. 1976; Nakaike, New Fl. Jap. Pterid. **698**. 1992; Shing et K. Iwats. in J. Jap. Bot. **72** (1): 27. 1997. — *Polypodium adnascens* Sw., Syn. Fil. **25**: 220. pl. 2. f. 2. 1806. — *Cyclosorus heterophyllus* Desv. in Berl. Mag. **5**: 301. 1811. — *Niphobolus caudatus* Kaulf., Enum. **127**. 1824. — *Pyrrosia caudata* (Kaulf.) Ching in Bull. Chin. Bot. Soc. **1**: 46. 1935. — *Polypodium pertusum* Roxb. ex Hook., Exot. Fl. **2**: pl. 26. 1825. — *Niphobolus carnosus* Blume, Enum. Pl. Jav. **2**: 105. 1828. — *Niphobolus elongatus* Blume, Enum. Pl. Jav. **2**: 105. 1828. — *Niphobolus spathulifer* Bory in Belang., Voy. Bot. **2**: 24. 1833. — *Niphobolus chamissonianus* C. Presl, Tent. Pterid. **201**. 1836. — *Polypodium pachydermum* Baker in J. Linn. Soc. **15**: 108. 1877. — *Pyrrosia pachyderma* (Baker) Ching in Bull. Chin. Bot. Soc. **1**: 46. 1935. — *Cyclophorus pustulosus* Christ in Not. Syst. **1**: 187. 1910. — *Cyclosorus bamleri* Rosenst in Fedde Rep. Sp. Nov. **10**: 339. 1912. — *Cyclophorus stellatus* Copel. in J. Arn. Arb. **10**: 179. 1929. — *Pyrrosia stellata* (Copel.) Parris in Fern Gaz. **12**: 119. 1980. — *Cyclosorus dimorphus* Copel. in J. Arn. Arb. **10**: 180. 1929. — *Pyrrosia dimorpha* (Copel.) Parris in Fern Gaz. **12**: 119. 1980. — *Pyrrosia lanceolata* auct. non (L.) Farw. Hovenk., Monogr. Pyrrosia **191**. 1986, p. p.

1a. 贴生石韦 (原变型) 图版 22: 1—3

f. *adnascens*

植株高约 5—12 厘米。根状茎细长, 攀援附生于树干和岩石上, 密生鳞片。鳞片披针形, 长渐尖头, 边缘具睫毛, 淡棕色, 着生处深棕色。叶远生, 二型, 肉质, 以关节