


1. 槐叶苹 (中国主要植物图说·蕨类植物门) 图版 83: 4—6

*Salvinia natans* (L.) All., Fl. Pedem. 2: 289. 1785; 傅书遐, 中国主要植物图说·蕨类植物门 257. 图 345. 1975; Ching et al. in W. Y. Chun, Fl. Hainan. 1: 205. 1964; Ic. Corm. Sin. 1: 284. f. 567. 1972; Fl. Tsinling 1: 202. t. 50: 4—6. 1974; De Vol in H. L. Li et al., Fl. Taiwan 1: 58. pl. 13. 1975 et Fl. Taiwan 2nd ed. 1: 539. pl. 209. 1994; B. Z. Ding et al., Fl. Honan 1: 121, f. 150. 1981; Fl. Fujian 1: 263. f. 250. 1982; C. J. Wu et al., Fl. Intramong. 1: 117, t. 23: 1—2. 1985; S. H. Li et J. Z. Wang, Fl. Liaoninig. 1: 122, t. 52: 3—4. 1988; C. Y. Yang, Fl. Xinjiang. 1: 50, t. 13: 6—8. 1992; Z. F. Zhang et S. Y. Zhang, Fl. Zhejiang 1: 335. f. 1—357. 1993; S. X. Xu in J. F. Cheng et al., Fl. Jiangxi 1: 356. f. 370. 1993.—*Marsilea natans* L., Sp. Pl. 2: 1099. 1753.

小型漂浮植物。茎细长而横走, 被褐色节状毛。三叶轮生, 上面二叶漂浮水面, 形如槐叶, 长圆形或椭圆形, 长 0.8—1.4 厘米, 宽 5—8 毫米, 顶端钝圆, 基部圆形或稍呈心形, 全缘; 叶柄长 1 毫米或近无柄。叶脉斜出, 在主脉两侧有小脉 15—20 对, 每条小脉上面有 5—8 束白色刚毛; 叶革质, 上面深绿色, 下面密被棕色茸毛。下面一叶悬垂水中, 细裂成线状, 被细毛, 形如须根, 起着根的作用。孢子果 4—8 个簇生于沉水叶的基部, 表面疏生成束的短毛, 小孢子果表面淡黄色, 大孢子果表面淡棕色。

广布长江流域和华北、东北以及远到新疆的水田中, 沟塘和静水溪河内。日本、越南和印度及欧洲均有分布。

全草入药, 煎服, 治虚劳发热, 湿疹, 外敷治丹毒, 疔疮和烫伤。



图版 83 1—3. 满江红 *Azolla imbricata* (Roxb.) Nakai; 1. 植株全形; 2. 植株全形 (放大); 3. 大小孢子果 (放大)。4—6. 槐叶萍 *Salvinia natans* (L.) All; 4. 植株全形; 5. 孢子果 (放大); 6. 孢子果纵切面 (放大)。

(冀朝祯绘)