

本属是由驼舌草属 *Goniolimon* Boiss. 划分出来的一个单种属,其区别在于:本属子房上端渐细(而非骤缩细),花柱下部具疣状突起(而非略长的乳头突起),花萼近管状而具狭钟状萼檐(非漏斗状有外展萼檐),花序轴除具侧生穗状花序外不分枝(既不2—3回分枝,也不作叉状分枝)。

1. 伊犁花 图版 4:4

Ikonnikovia kaufmanniana (Regel) Lincz. in Kom. Fl. URSS **18**: 381. t. 19. f. 3. 1952. — *Statice kaufmanniana* Regel in Act. Hort. Petrop. **6** (2): 300. 1880; et in Gartenfl. **29**: 1. t. 996. 1880. — *Limonium kaufmannianum* (Regel) Kuntze, Rev. Gen. Pl. **2**: 395. 1891. — *Goniolimon kaufmannianum* (Regel) Voss, Vilm. Blumeng. ed. 3. **1**: 614. 1894.

草本状小灌木,连同枝和花序轴高约14—35(50)厘米。枝通常粗短,长1—6(10)厘米,密被历年残存的叶柄。叶灰绿色,有时下面变紫红色,线状披针形、披针形至倒披针形,长3—7(10)厘米,宽0.6—1.5(2.5)厘米,先端通常渐尖而具短硬尖,基部渐窄成宽扁的柄,两面有细小钙质颗粒,边缘有起伏而常卷褶成弯缺的波状皱。花序由莲座叶丛近基部的叶腋生出;花序轴具1顶生穗状花序,并常有1—3个或较多的侧生穗状花序;穗状花序略弓曲,由4—11个小穗偏于一侧密列而成;小穗含2—4花;外苞长约9—11毫米,宽卵形至椭圆状倒卵形,先端有一伸出的渐尖长硬尖,被毛至渐变无毛,第一内苞与外苞相似而略短;萼长8—9毫米,萼筒直径约1毫米,沿脉和脉间的棱上密被短柔毛,萼檐膜质,黄白色至淡黄褐色,沿脉被毛,先端有5个窄长(长约2毫米)而尖锐的直立裂片,有时具齿状间生小裂片;花冠紫红色,裂片先端浅凹。花期6—8月,果期7—9月。

产新疆(伊犁盆地);生于低山坡和山麓,常见于有砾石的土地上。分布局限于伊犁河流域。合模式标本采于新疆尼勒克县(喀什河)和察布查尔县(林场)境内。

6. 驼舌草属*——*Goniolimon* Boiss.

Boiss. in DC. Prodr. **12**: 632. 1848. — *Statice* sect. *Tropidice* Griseb.

Spicil. Fl. Rumel. **2**: 299. 1846.

多年生草本;根端有肥大的茎基,茎基上端常因侧芽发育成极短的木质分枝而在贴近地面呈多头状。叶基生,呈莲座状(每一茎基分枝上生一丛),全缘,先端常有短尖。花序轴1—2枚,少有较多,由叶腋生出,或多或少有叉状、交互或偏向一侧的分枝,并且往往再作二回或三回分枝;穗状花序位于各级分枝的上部和顶端,由2至多个小穗组成;小穗含

* 名见《蒙古人民共和国放牧地和割草地的饲料植物》,后文简称《饲用植物》。异名:棱枝草属(中国高等植物图鉴)。



1. 疏花驼舌草 *Goniolimon callicomum* (C. A. Mey.) Boiss.: 植株。 2—3. 团花驼舌草 *G. eximium* (Schrenk) Boiss.: 2. 植株, 3. 花萼。 4. 伊犁花 *Ikonnikovia kaufmanniana* (Regel) Lincz.: 植株。(李森绘)