

色,宽 3.5—4 毫米(占花萼长度的一半),开张幅径与萼的长度相等,裂片宽短而先端圆,通常有一易落的软尖,间生裂片明显,脉伸至裂片基部或接近顶缘处变为无色,沿脉被微柔毛;花冠淡紫色(有时上部无色)。花期 5(下旬)—7(上旬)月,果期 6—8 月。

我国特产。分布于辽宁(大连)、山东半岛至江苏东北部(赣榆);生于海滨至近海地区的山坡或砂地上。模式标本采于山东烟台芝罘岛。

Gandoger 的种与 *O. Debeaux* 的种建立在同一号模式标本上。二者的原记载均谓此种植物“花冠金黄色”,应是出于 *O. Debeaux* 采集记录的错误;这种植物的花冠实际上为淡紫色。在烟台一带海滨,这种植物在 6 月下旬花期已过(内陆山区可至 7 月上旬),*O. Debeaux* 采集的时间在 7 月中下旬,萼已变白,不可能看到它的花冠颜色;此时正开花的却是补血草 *L. sinense* (Girard) Kuntze。然而 *Debeaux* 所指出的同二色补血草的区别,图版 I 中第 2 图所绘萼的形态,以及 Gandoger 关于萼檐幅径等记载,清楚地阐明了这种植物的特征;在芝罘岛以及整个山东半岛,只有花冠淡紫色的植物符合 *Debeaux* 和 Gandoger 的描写。

至于 Swinhoë 采于大连的标本,*Debeaux* 认为其花序轴圆,应属于他的新种;Forbes 和 Hemsley 根据藏于邱园的 Swinhoë 的标本则认为应属于二色补血草。对 Swinhoë 的标本我们不了解,然而大连附近岛屿上确已发现有烟台补血草存在。

4. 海芙蓉(台湾)

Limonium wrightii (Hance) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 396. 1891; Hara, Enum. Spermat. Jap. 1: 99. 1948 (incl. var. *roseum* Hara); 中国高等植物图鉴 3: 291. 1974, in adnota.——*Statice wrightii* Hance in Ann. Sci. Nat. V. 5: 236. 1866.——*S. arbuscula* Maxim. in Trauv. Regel, Maxim. Winkl. Decas Pl. Nov. 8. 1882.——*Limonium arbusculum* (Maxim.) Makino, Ill. Fl. Nipp. 228. f. 684. 1940.

4a. 海芙蓉(原变种)

var. ***wrightii***

矮小半灌木;老枝黑褐色,密被残存的叶柄基部;全株(除萼外)无毛。叶集于枝的上部(当年枝),肥厚,长 2—4 厘米,宽约 4—7 毫米,倒披针形,先端圆,下部渐狭成柄,基部扩张而半抱茎,中肋不显明。花序伞房状,花序轴由叶腋抽出,高 7—16 厘米,自上部二回叉状分枝;穗状花序通常由 5—11 个小穗组成;小穗含 2—4 花;外苞长约 2—2.5 毫米,宽卵形,先端锐尖,第一内苞长约 5 毫米,宽椭圆形,先端圆;萼长约 5 毫米,漏斗状,筒部沿脉被长毛,萼檐白色,通常褶皱叠而微开张,裂片尖三角形,下部沿脉被毛,花冠淡紫红色。

花期 8—9 月,果期 9—10 月。

产台湾(南部与东部海滨、兰屿、火烧岛、棉花屿、钓鱼岛);生于海岸和岛屿的岩石缝隙。日本也有。模式标本采自日本的琉球群岛。

本种植物在台湾省民间为治疗风湿疼痛和高血压等症的常用草药。