

11. 簇枝补血草

Limonium chrysocomum (Kar. et Kir.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. **2**: 395. 1891. —
L. chrysocomum (Kar. et Kir.) Kuntze var. *pubescens* Lincz. in Kom. Fl. URSS **18**: 432.
 1952. in obs., nom. nud. — *Statice chrysocoma* Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Moscou
15: 429. 1842. — *S. schrenkiana* Fisch. et Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. St. Pé-
 tersb. **1**: 362. 1843.

11a. 簇枝补血草(原变种) 图版 6: 5—6

var. **chrysocomum**

多年生草本至草本状半灌木。茎基肥大, 木质, 顶端丛出短的木质分枝(逐年或多或少加长), 枝端具一顶芽或再由多芽簇集成为多头状, 其上端密被白色膜质鳞片和残存的叶柄基部。叶由每芽发出数枚, 线状披针形至长圆状匙形, 小, 长 5—20(25) 毫米, 宽 0.5—1.5(4) 毫米, 先端渐尖至钝圆, 下部渐狭成柄。花序呈一顶生的头状, 花序轴细弱, 高 7—20(25) 厘米, 略有棱角, 或多或少具疣状突起(至少在上端或部分不育枝上), 各节的膜质鳞片腋部簇生(1)3—5 枝针状不育枝; 不育枝长约 1—1.5(3) 厘米(为其基部鳞片长度的 2—6 倍), 开张, 细而直, 简单或偶具一短分枝; 穗状花序由(3)5—7(9) 个小穗组成, 单个或 2—3 个集于花序轴顶端呈紧密头状团簇; 小穗含 2—3(5) 花; 外苞长(3.5)4—5 毫米, 宽卵形, 先端急尖或钝, 无或局部有短毛(长约 0.5 毫米), 第一内苞长(7)8—10 毫米, 先端圆, 无毛或局部有短毛; 萼长 9—12 毫米, 漏斗状, 萼筒径约 1.5 毫米, 全长沿脉与脉间被毛, 萼檐鲜黄色, 裂片先端钝或有短尖, 脉伸至裂片基部而消失, 有时具间生裂片; 花冠橙黄色。 花期 6—7 月, 果期 7—8 月。

产新疆北部; 生于石质山坡上。蒙古和苏联也有。模式标本采于塔尔巴哈台山脉西端一带。

略与原变种有所不同的, 还有另外 3 个变种, 它们之间的区别如下:

簇枝补血草变种检索表

- 1. 萼长 8.5—12 毫米; 萼筒中部直径约 1.3—1.5 毫米。
 - 2. 第一内苞无毛或局部被短毛; 花序轴或不育枝上通常具疣……11a. 簇枝补血草 var. **chrysocomum**
 - 2. 第一内苞密被较长的毛(长约 1 毫米)和短毛; 花序轴和不育枝上无疣……………11b. 大簇补血草 var. **semenowii** (Herd.) Peng
- 1. 萼长 5—7 毫米; 萼筒中部直径约 1 毫米。
 - 3. 不育枝开张, 多数显然比鳞片长……………11c. 细簇补血草 var. **chrysocephalum** (Regel) Peng
 - 3. 不育枝近直立而贴于花序轴, 比鳞片短或近等长, 通常藏于鳞片之内……………11d. 矮簇补血草 var. **sedoides** (Regel) Peng

11b. 大簇补血草(变种)