

var. **semenowii** (Herd.) Peng, comb. nov. — *Statice semenowii* Herd. in Bull. Soc. Nat. Moscou **41**(1): 398. 1868. — *L. semenowii* (Herd.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. **2**: 396. 1891; Lincz. in Kom. Fl. URSS **18**: 432. 1952 (*semenovii*), incl. var. *glabrum* Lincz. (nom.).

花序轴通常较高(约 20—40 厘米),无疣;不育枝长约 (1)2—3.5(5.5) 厘米,开张,简单或偶具一短分枝;外苞和第一内苞草质部密被较长的毛(长约 1 毫米)和短毛,少有全部无毛;萼长 8.5—11 毫米,萼筒径约 1.3 毫米,裂片先端通常有短尖。

产新疆(天山至北疆西部);生于低山石质山坡。苏联也有。模式标本采于准噶尔山脉南端。

### 11c. 细簇补血草(变种)

var. **chrysocephalum** (Regel) Peng, comb. nov. — *Statice chrysocephala* Regel in Act. Hort. Petrop. **6**(2): 383. 1880. — *L. chrysocephalum* (Regel) Lincz. in Kom. Fl. URSS **18**: 434. 1952. in adnota.

花序轴高 5—8(13) 厘米,节间长约 1—2(6) 毫米,初时具疣,后变光滑;不育枝通常长 2—7 毫米(比鳞片有短有长),有时可达 1—1.5 厘米(为鳞片长度的 2—3 倍),开张,不分枝;头状花序较小,通常含 3—5 (少有达 10 枚以上) 小穗;外苞和第一内苞草质部密被短毛或杂有少数较长的毛(有时外苞毛稀少或近无毛);萼长 6—7 毫米,萼筒径约 1 毫米。

仅知产新疆北部;生于荒漠草原的石质山坡上。模式标本采于赛里木湖一带。

### 11d. 矮簇补血草(变种)

var. **sedoides** (Regel) Peng, comb. nov. — *Statice sedoides* Regel in Act. Hort. Petrop. **6**(2): 384. 1880. — *L. sedoides* (Regel) Kuntze, Rev. Gen. Pl. **2**: 396. 1891.

植株矮小;花序轴高 2—3.5 厘米,节间短(约 0.5—1 毫米),光滑或上端略有疣;不育枝长约 1—2.5(4) 毫米,不分枝,比鳞片短或近等长,罕微长,近直立,藏于鳞片之内;头状花序小,通常仅有 (1)2—5 个小穗;外苞和第一内苞草质部密被短毛或变无毛。萼长 5—6 毫米,萼筒径约 1 毫米。

仅产北疆西部;生于荒漠草原的砾石山坡上。合模式标本采于博乐与精河县南山一带。

组 2. 管萼组 — Sect. *Siphonocalyx* Lincz. in Kom. Fl. URSS **18**: 749. 1952.

多年生草本;叶基生;花萼管状,萼檐直立,萼筒下部直而不显偏斜;花瓣全缘。

### 12. 弯穗补血草

**Limonium drepanostachyum** Ik.-Gal. in Act. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS I. **2**: 267. f. 4. 1936; Lincz. in Kom. Fl. URSS **18**: 465. 1952.

### 12a. 弯穗补血草(原亚种)

ssp. **drepanostachyum**