

枚,长圆状倒卵形,长 1.3 厘米,宽 1 厘米,厚 0.6 厘米,光滑,亮褐色,疤痕披针形(标本未见,摘自 van Royen 的描写)。

产西藏东南部,海拔约 1800 米。印度、不丹、尼泊尔也有。

8. 刺榄属*——*Xantolis* Raf.

Raf. Sylv. Tell., 36. 1838; van Royen in Blumea 8:207. 1957.

乔木或灌木,通常具刺。叶互生,有时与花密聚于短枝顶部,全缘,侧脉羽状,具一条边脉,第三次脉稀疏,纤细,横生或网状;无托叶。花两性,5 数,单生或簇生叶腋,苞片小;花萼具短管,裂片多披针形,凋而不落;花冠裂片比花冠管长,里面被毛;能育雄蕊通常着生于花冠裂片基部,花丝无毛,基部两侧常有簇生的锈色硬毛,稀仅一侧具毛,花药箭头状,具延长的药隔,外向或稍侧向开裂,稀内向开裂;退化雄蕊花瓣状,通常具长芒,边缘流苏状撕裂,稀齿状或全缘;子房 5 室,稀 4 室,密被长硬毛,无花盘,花柱长,伸出花冠,胚珠着生每室上半部或基部,珠柄通常长。果核果状;种子 1—2 枚,椭圆形,侧向压扁,种皮壳质坚脆,疤痕卵形或线形,通常为种子长的 2/3 或更长,或小而圆形,基生,胚乳丰富,子叶叶状,胚根伸出。

约 14 种,产亚洲大陆东南部及菲律宾(吕宋)。我国广东沿海及云南产 4 种。

分种检索表

1. 果橄榄形;萼片披针形或卵状披针形。

2. 叶披针形、倒披针形或长圆状披针形,侧脉 15—17 对;花冠裂片披针形;子房密被锈色柔毛
..... 1. 滇刺榄 *X. stenosepala* (Hu) van Royen

2. 叶椭圆形、卵形或倒卵形,侧脉 9—13 对;花冠裂片圆形;子房被白色绢毛
..... 2. 喙果刺榄 *X. boniana* var. *rostrata* (Merr.) van Royen

1. 果近球形;萼片卵形或三角形。

3. 叶倒卵形,较小,长 2—4 厘米,宽 1—2.3 厘米;花瓣白色,全缘;果较小,长 1.2 厘米;枝通常具刺
..... 3. 琼刺榄 *X. longispinosa* (Merr.) H. S. Lo

3. 叶披针形或椭圆形,较大,长 5—10 厘米,宽 1.3—2.5 厘米;花瓣淡黄色,基部的边缘流苏状撕裂;果较大,长 3 厘米;枝无刺 1. 瑞丽刺榄 *X. shweliensis* (W. W. Smith) van Royen

1. 滇刺榄 狭萼荷包果、鸡心果、漫板树(云南) 图版 12:5—8

Xantolis stenosepala (Hu) van Royen in Blumea 8: 216, f. 3. 1957; 中国高等植物图鉴 3: 299, 图 4552. 1974; 云南植物志 1: 308. 1977. —— *Adinandra steosepala* Hu,

* 异名: 荷包果属(云南植物志)