

Bull. Fan Mem. Inst. Biol. **8**: 148. 1938. — *Planchonella stenosepala* (Hu) Hu, l. c. **10**: 129. 1940. — *Xantolis boniana* (Dubard) van Royen var. *rostrata* auct. non (Merr.) van Royen: 云南植物志 **1**: 308. 1977.

1a. 滇刺欖(原变种)

var. *stenosepala*

乔木, 高 6—15(20) 米; 树皮灰褐色; 小枝具棱, 被灰色或浅黄褐色绒毛或近无毛。叶革质, 披针形、倒披针形或长圆状披针形, 长 (5)7—15(18) 厘米, 宽 2.5—6 厘米, 先端渐尖, 基部阔楔形, 被灰色短柔毛或几无毛, 上面绿色, 具光泽, 下面淡绿色, 中脉在上面明显, 下面凸起, 侧脉 15—17 对, 成 40—55° 上升, 弧形, 和第三次脉在上面明显, 下面凸起; 叶柄长 8—18 毫米, 上面具宽沟, 被灰色绒毛或近无毛。花单生或几朵簇生叶腋, 花梗长 6—10 毫米, 被灰色绢毛; 花萼裂片 5, 披针形或卵状披针形, 长 4—6 毫米, 宽 1.5—3 毫米, 外面被灰色绢毛, 里面被锈色绢毛; 花冠白色, 冠管短, 裂片 5, 披针形, 长约 6.5 毫米, 宽约 2 毫米; 能育雄蕊 5, 长 3—5 毫米, 花丝钻形, 长 1—2 毫米, 基部两侧各具一簇长柔毛, 花药箭形, 长 2—3 毫米, 药隔延长, 内向开裂; 退化雄蕊 5, 披针形, 长约 4 毫米, 先端渐尖而呈芒状, 沿边缘密被柔毛; 子房卵球形, 径 1—2 毫米, 密被锈色柔毛, 5 室, 每室具一基生胚珠, 花柱长 10—12 毫米, 基部被长柔毛, 上部无毛, 柱头不明显。果绿转褐色, 长圆状卵形, 长 3—4 厘米, 宽 1.7—2.2(3) 厘米, 被锈色绢毛或短柔毛, 果皮坚硬, 先端具长达 15 毫米的宿存花柱, 基部具宿萼; 种子通常 1 枚, 稀 2 或 3 枚, 椭圆形, 两端近圆形, 两侧压扁, 长约 2—2.5 厘米, 宽约 1.2 厘米, 种皮褐色, 具光泽, 疤痕狭长圆形。花果期全年。

产云南西双版纳地区; 生于海拔 1150—1770 米的林中、村落附近或矮草地上。

果可食。

1b. 短柱滇刺欖(变种)

var. *brevistylis* C. Y. Wu, 云南植物志 **1**: 309. 1977.

与原变种的区别在于: 花萼裂片卵形, 长 3—4 毫米, 宽 2—3 毫米; 花柱较短, 长 4—7 毫米, 基部无毛; 花瓣长圆形, 长约 5 毫米, 宽约 2.5 毫米。果近无毛。

产云南西双版纳; 生于海拔 1150 米的沟底密林中。

2. 越南刺欖

Xantolis boniana (Dubard) van Royen in Blumea **8**: 212. 1957; Aubr. Fl. Camb. Laos et Vietn. **3**: 82. pl. 13 7—9. 1963.

2a. 越南刺欖(原变种)

var. *boniana*

叶长 6—11 厘米, 宽 3—5.5 厘米, 无毛, 侧脉每边 5—6 条。

产越南北部及老挝, 我国不产。

2b. 喙果刺欖(变种)