

栽培 1 种。

1. 蛋黄果 图版 9: 4—7

Lucuma nervosa A. DC. in DC. Prodr. 8: 169. 1864.

小乔木, 高约 6 米; 小枝圆柱形, 灰褐色, 嫩枝被褐色短绒毛。叶坚纸质, 狭椭圆形, 长 10—15(20) 厘米, 宽 2.5—3.5(4.5) 厘米, 先端渐尖, 基部楔形, 两面无毛, 中脉在上面微凸, 下面浑圆且十分凸起, 侧脉 13—16 对, 斜上升至叶缘弧曲上升, 两面均明显, 第三次脉呈网状, 两面均明显; 叶柄长 1—2 厘米。花 1(2) 朵生于叶腋, 花梗圆柱形, 长 1.2—1.7 厘米, 被褐色细绒毛; 花萼裂片通常 5, 稀 6—7, 卵形或阔卵形, 长约 7 毫米, 宽约 5 毫米, 内面的略长, 外面被黄白色细绒毛, 内面无毛; 花冠较萼长, 长约 1 厘米, 外面被黄白色细绒毛, 内面无毛, 冠管圆筒形, 长约 5 毫米, 花冠裂片 (4) 6, 狭卵形, 长约 5 毫米; 能育雄蕊通常 5, 花丝钻形, 长约 2 毫米, 被白色极细绒毛, 花药心状椭圆形, 长约 1.5 毫米; 退化雄蕊狭披针形至钻形, 长约 3 毫米, 被白色极细绒毛; 子房圆锥形, 长 3—4 毫米, 被黄褐色绒毛, 5 室, 花柱圆柱形, 长 4—5 毫米, 无毛, 柱头头状。果倒卵形, 长约 8 厘米, 绿色转蛋黄色, 无毛, 外果皮极薄, 中果皮肉质, 肥厚, 蛋黄色, 可食, 味如鸡蛋黄, 故名蛋黄果; 种子 2—4 枚, 椭圆形, 压扁, 长 4—5 厘米, 黄褐色, 具光泽, 疤痕侧生, 长圆形, 几与种子等长。花期春季, 果期秋季。

广东、广西、云南西双版纳有少量栽培。

10. 桃榄属*——*Pouteria* Aublet

Aublet, Hist. Pl. Guine Fr. 1: 85. 1775, excl. fr., sensu Eyma in Rec. Trav. Bot. Neerl. 33: 159. 1936; M. P. M. Hermann-Erlee and van Royen in Blumea 8: 453. 1957.

乔木或灌木, 具乳汁。小枝圆柱形, 幼时无毛或被柔毛后变无毛。无托叶。叶纸质至厚革质, 互生, 有时近对生、散生或多少聚生于小枝顶端, 幼时通常两面被柔毛, 成熟时无毛, 有时上面被紧贴柔毛, 下面稀近无毛, 或幼时即两面无毛, 侧脉明显, 第三次脉互相平行或呈网状; 具叶柄。花簇生叶腋, 有时生于短枝上, 具花梗或有时无梗; 有时具 2—4 枚小苞片; 花萼基部联合, 裂片 5, 稀 4 或 6, 外面被柔毛, 内面无毛或被绢毛, 早落或果时宿存; 花冠管状或钟状, 裂片 5, 有时 4 或多至 8, 无附属物; 能育雄蕊 5, 有时 4 或多至 8, 着生于花冠管喉部上下; 退化雄蕊 5, 或更少, 稀缺, 或有时可多至 8, 披针形或钻形, 有时鳞片状或花瓣状, 着生于花冠管喉部, 与花萼裂片对生; 子房圆锥形, 向上逐渐狭窄成花柱, 有时基部围以杯状花盘, 5 室, 稀 6 室, 多少密被长柔毛, 稀无毛。果圆球形, 无毛或被

*异名: 山榄属(云南植物志)



1—3. 人心果 *Manilkara zapota* (Linn.) van Royen: 1.果枝, 2.花枝, 3.花冠展开。4—7. 蛋黄果 *Lucuma nervosa* DC.: 4.果枝, 5.花冠展开 6—7.种子。