

微柔毛。幼枝褐色，有细条纹，成熟时不趋无毛；老枝灰褐色，疏被微柔毛；皮孔椭圆形，显著，皮层开裂。冬芽小，不明显。叶革质，椭圆形至长圆形，长9—13.5厘米，宽3.5—4.5厘米，先端渐尖，基部浑圆，中脉上面凹陷，下面凸起，侧脉每边7—9条，在两面上都凸起，网脉亦在两面上凸起；叶柄长约8毫米。雌雄花未见。果褐色，直径约2.5厘米，基部密被平伏黄绒毛，余处近无毛；宿存萼片狭三角形，长8毫米，反曲；果柄长约1.2厘米，着生于幼枝基部，先端增大而稍弯，近顶部有1苞片痕。果期11月。

产云南(砚山)；生于海拔1100米的山谷密林中。

本种幼枝密被污黄色微柔毛，成熟时不趋于无毛，冬芽、叶上面中脉和侧脉上、叶柄等处亦有同样的毛；果有长约1.2厘米的柄，果直径约2.5厘米，基部密被黄绒毛。

### 55b. 无毛网脉柿(变种)(新拟) 图版37

var. *glabrescens* C. Y. Wu. 云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 13. 1965.

和网脉柿原变种的区别在于：幼枝近无毛，果柄较短，长5—8毫米。雄花序总梗、花梗、花冠檐部里面和苞片外面被污黄色微柔毛。雄花序伞形，3花，有总梗，着生于幼枝基部；总梗长约7毫米；花萼短小，杯状，长2毫米，外被褐色糙伏毛，4深裂；裂片狭三角形，长1.5毫米，先端渐尖；花冠坛状管形，长6毫米，外面密被黄褐色微柔毛；裂片三角状卵圆形，长宽各约2毫米；雄蕊16枚，排成2列；花药椭圆形；花丝扁，边缘具纤毛；退化子房顶端密被锈色髯毛；花梗长3—4毫米，近基部有苞片；苞片线形，长3—4.5毫米。花期3—4月。

产云南东南部。

### 56. 海边柿(新拟) 黄心仔 图版36:3—5

*Diospyros maritima* Bl. Bijdr. Fl. Nederl. Ind. 669. 1875; A. DC. in DC. Prodr. 8: 234. 1844; Hiern in Trans. Cambr. Phil. Soc. 12: 211. 1873 (Monogr. Ebenac.); Kanekohira, Form. Trees rev. ed. 575. f. 532. 1936; Li, Woody Fl. Taiwan 731. 1963.—*D. liukiuensis* Mak. in Bot. Mag. Tokyo 22: 159. 1908.—*D. kusanoi* Hay. in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 30: 186. 1911 (Mat. Fl. Form.).

常绿小乔木，树皮黑色；木材带黄色或褐色；除芽和花序外，各处无毛。芽有绢毛。叶革质，椭圆形至倒卵状长圆形，长7—17厘米，宽3—8厘米，先端圆形至钝，基部钝至稍渐狭，近叶柄处有2明显的腺体，两面无毛，颜色相近，有时下面变无毛，中脉在上面凹陷，在下面明显凸起，侧脉每边约7条，纤细，在上面平坦或微凹陷，下面较明显，小脉很纤细，在两面上均不甚明显；叶柄长8—10毫米，上面有槽。花雌雄异株。花序腋生，几无总梗，聚伞花序式，基部有苞片。雄花序有花2—3朵。雄花花萼钟状，4齿裂，两面均有绢毛；花冠管外面有绢毛，内面无毛，4裂；雄蕊16枚；花丝基部和子房有长粗毛。雌花单生，无梗；花萼4裂，两面有绢毛；花冠外面有绢毛，内面无毛，管卵状，4裂；有退化雄蕊。子房卵形，有锈色毛，8室，每室有1胚珠。果扁球形，初时常卵形，直径1.5—3厘米，顶端有小突

尖，橙红色，光亮，除顶端外变无毛，有种子4—8颗；种子扁，椭圆形，长约1厘米，直径约6毫米，褐色，光亮；宿存萼近方形，直径约2厘米，不明显的4—5裂，外面多少变无毛，内面有栗色绢毛，裂片宽三角形，长约4毫米，宽约10毫米，向后反曲，先端急尖。

产台湾省北部；散生在海岸灌木丛中；分布于东南亚，自日本的琉球群岛、中南半岛、菲律宾、印度尼西亚，南至澳大利亚北部，东至波利尼西亚。

果和树皮具有强烈麻醉性。将树皮磨成粉，放入袋内投下水中，可以药鱼。木材易施工，可作家具、用具、枪托等，并且是良好薪炭材。

本种常生长在海边灌丛中，叶片基部叶柄附近有2明显的腺体，容易认识。

### 57. 象牙树 乌皮石柃、琉球黑檀(台湾省) 图版36：2

*Diospyros ferrea* (Willd.) Bakh. in Gard. Bull. Str. Settlem. 7: 162. 1933 (Enum. Mal. Ebenac.); et in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, Ser. 3; 15: 50. 1937.—*Pisonia buxifolia* Rottb. in Nov. Act. Hafh. 2: 536. t. 4, f. 2. 1783.—*Ehretia ferrea* Willd. Phytogr. 1: 4. t. 2, f. 2. 1794.—*Maba buxifolia* (Rottb.) A. L. Juss. in Ann. Mus. Hist. Nat. 5: 418. 1804; A. DC. in DC. Prodr. 8: 240. 1844; Hiern in Trans. Cambr. Phil. Soc. 12: 116. 1873 (Monogr. Ebenac.); Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 551. 1882; Hay. in Journ. Coll. Sci. Tokyo 30: 186. 1911 (Mat. Fl. Formosa); Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 973, f. 112. 1930;—*Diospyros ferrea* (Willd.) Bakh. var. *buxifolia* (Rottb.) Bakh. in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, Ser. 3. 15: 57. 1937; Li, Woody Fl. Taiwan 735. f. 299. 1963.

常绿小乔木或乔木；树皮灰褐色或带黑色；小枝纤细，带灰色，有柔毛或硬毛至变无毛，有散生的皮孔；芽狭长圆形或锥尖状，有棕色伏柔毛或粗毛。叶革质，倒卵形，长2—4厘米，宽2厘米，先端钝或圆形，常微缺，基部渐狭或钝，边缘微背卷，上面深绿色，有光泽，下面绿色，中脉在上面成浅槽状，下面明显凸起，侧脉每边5—7条，细弱，多数不明显；叶柄长约2毫米，有毛或变无毛。花雌雄异株；雄花序有花1—3朵，密被伏柔毛；雄花小，近无梗，花萼、花冠均3裂；花萼密被毛；花冠带白色或淡黄色，外面有毛；雄蕊通常6—12枚；退化子房密被粗硬毛；雌花无梗或近无梗；花萼3—5裂，外面薄被绒毛，裂片有睫毛；花冠管状钟形，有柔毛；无退化雄蕊；子房卵形，密被粗硬毛，极少近无毛，3室，每室有胚珠2颗；花柱短，顶端略3裂。果椭圆形，长8—13毫米，直径约8毫米，成熟时秃净，顶端有短尖头，有黑色的种子1颗；宿存萼杯状或钟状，直径约6毫米，高3—5毫米，外面有柔毛或秃净，里面有绢毛或近无毛。

产台湾省南部的恒春半岛和兰屿；不多见，生于海岸阔叶常绿林中，台北有栽培。印度、斯里兰卡、缅甸、马来西亚、印度尼西亚等地有分布。

心材黑色，坚重致密，磨之有光泽，用途和乌木相等，可作小用具、手杖等。木材深埋地下日久，渐起化石作用，质地更加坚重，颜色也更暗，即“阴沉木”的一种，是有名装饰用



1. 苗山柿 *Diospyros miaoshanica* S. Lee: 果枝。2. 象牙树 *D. ferrea* (Willd.) Bakh.: 果枝。3—5. 海边柿 *D. maritima* Bl.: 3. 果枝, 4. 叶正面观, 5. 叶背面观。(刘宗汉绘)