

7 毫米,外面密被黄褐色星状绒毛和长柔毛,内面被白色短柔毛,萼齿钻形或三角形,不等长,长 1—1.5 毫米;花冠裂片椭圆形或卵状椭圆形,长 9—11 毫米,宽 4—6 毫米,两面均被星状短柔毛,花蕾时作覆瓦状排列,花冠管长约 4 毫米,无毛;花丝扁平,下部联合成管,上部分离,分离部分的下部密被白色星状柔毛,花药长圆形,药隔无毛,边缘疏被星状毛,长约 4 毫米;花柱基部被粗毛。果实球形,直径 1—1.5 厘米,顶端常具短尖头,密被灰白色星状短柔毛,具不规则纵皱纹,基部较为明显;种子卵形,褐色,无毛。花期 3—4 月,果期 8—10 月。

产云南(大理、鹤庆、楚雄)和四川(盐源、石棉、木里)。生于海拔 1700—2400 米干旱山坡的稀树草原上。模式标本采自云南楚雄。


7. 瓦山安息香(新拟) 瑞丽野茉莉(中国高等植物图鉴) 图版 30: 6—9

Styrax perkinsiae Rehd. in Sargent, Pl. Wils. **1**: 292 1912; Cheng in Mem. Sci. Soc. China **1**: 209. 1924; S. M. Hwang in Acta Phytotax. Sin. **18**(2): 162. 1980. — *S. shweliensis* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. **12**: 236. 1920; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 804. 1936; Bean, Trees et Shrubs Brit. Isle 1 ed. **3**: 469. 1933; 中国高等植物图鉴 **3**: 337. 1974.

灌木或小乔木,高 2—6(—10 米),胸径约 25 厘米;嫩枝近圆柱形,初被灰白色星状绒毛,很快变无毛,紫褐色。叶互生,纸质,卵形、卵状椭圆形或椭圆状披针形,长 5—8 厘米,宽 3—5 厘米,顶端短渐尖至急尖,基部圆形或宽楔形,边近全缘或有细锯齿,上面除叶脉上有褐色星状短柔毛外,其余被单生或 2—3 分歧星状短柔毛,以后无毛而粗糙,下面叶脉上疏生黄褐色星状柔毛,其余密被白色星状绒毛,侧脉每边 5—6 条,第三级小脉近平行而较稀疏,上面平坦或稍隆起,下面明显隆起;叶柄长 3—5 毫米,被黄色星状短柔毛。总状花序顶生,有花 3—4 朵;花序长 4—6 厘米;花白色,长约 2 厘米;花梗长 5—9 毫米,密被灰黄褐色或锈褐色星状绒毛;小苞片钻形,长 3—4 毫米,早落;花萼杯状,高约 5 毫米,外面密被黄褐色或锈褐色星状绒毛和稀疏星状柔毛,内面无毛;萼齿不规则,钻形,长不超过 1.5 毫米;花冠裂片椭圆形或倒卵状椭圆形,长约 1.5 毫米,宽 5—6 毫米,外面密被星状细柔毛,内面顶端有白色柔毛,花蕾时覆瓦状排列,花冠管长约 3 毫米;花丝扁平,下面联合成管,上部分离,分离部分的下部有白色星状长柔毛,上部无毛,花药长圆形,长约 4 毫米,边缘被星状毛;花柱长约 13 毫米,疏被星状粗毛。果实卵形,长 12—18 毫米,直径约 10 毫米,有短尖头;种子 1—2 颗,平滑,褐色。花期 3—4 月,果期 7—8 月。

产云南(楚雄、大理、彝良、镇雄、瑞丽)、四川(峨边、石棉、越西)。生于海拔 500—2500 米的山坡、湿润常绿阔叶林中。模式标本采自四川峨边北部瓦山。

8. 野茉莉(亨利氏中国植物名录) 耳完桃(广东翁源), 君迁子(陕西紫阳), 木桔子(湖北), 黑茶花、茉莉苞、野花梣(亨利氏中国植物名录), 齐墩果(日人误释) 图版 31: 1—7



1—5. 楚雄安息香 *Styrax limprichtii* Lingelsh: 1. 花枝, 2. 花, 3. 雄蕊, 4. 果实, 5. 种子。6—9. 瓦山安息香 *Styrax perkinsiae* Rehd.: 6. 花枝, 7. 果枝, 8. 雄蕊, 9. 雌蕊。(黄少容、邓晶发绘)