

或2朵聚生于小枝顶端,有时3朵排成顶生的总状花序,长3—5厘米;花梗纤细,长1.5—2厘米,无毛;小苞片线状披针形,长约1厘米;花萼杯状,膜质,高约3毫米,宽约3.5毫米,褐色,无毛,顶端有5—6个钻状小齿;花冠裂片披针形或卵状披针形,长10—12毫米,宽3—4毫米,外面密被黄色星状绒毛,内面无毛,花蕾时作镊合状排列,边缘常稍内卷,花冠管长约3毫米;雄蕊约与花冠等长或稍短,花丝扁平,下部联合成管,上部分离,分离部分的下部被白色星状长柔毛,上部无毛,花药长圆形,长约6毫米;花柱较雄蕊长,无毛,柱头头状。果实卵形,直径约1厘米,顶端具短尖头,成熟时3瓣开裂;种子褐色,卵形,无毛。花期4月,果期8月。

产江西东北部和安徽南部。生于山脚下阴湿处、水边或较潮湿处。模式标本采自江西婺源。

19. 银叶安息香(广西) 图版 36:1—6

Styrax argentifolius Li in Journ. Arn. Arb. 24: 371. 1943.


乔木,高5—15米,胸径约40厘米;树皮灰色或暗灰色;嫩枝密被褐色紧贴鳞片状毛,以后无毛,灰棕色。叶革质,椭圆形、卵状披针形或椭圆状披针形,长5—15厘米,宽2.5—6厘米,顶端渐尖或钝渐尖,基部宽楔形至圆形,边近全缘,上面干后暗绿色或黄绿色,无毛,下面密被银灰色或浅棕色紧贴鳞片状毛,光亮,侧脉每边5—8条,上面稍凹入,下面明显隆起,第三级小脉近平行;叶柄长7—10毫米,密被褐色紧贴鳞片状毛。总状花序顶生或腋生,长1.2—1.6厘米,有花3—9朵;花序梗、花梗、小苞片和花萼均密被褐色紧贴鳞片状毛;花白色,长1.2—1.6厘米;花梗长1—2毫米;小苞片钻形,长约3毫米;花萼杯状,高约3毫米,宽约3.5毫米,顶端近截形或不明显5齿;花冠裂片4—5,披针形,长8—9毫米,宽约2毫米,外面和内面边缘以及顶端均密被淡黄色星状短柔毛,边缘稍内折,花蕾时镊合状排列,花冠管长6—7毫米;雄蕊8—10枚,较花冠为短,花丝扁平,下部联合成管,并与花冠管贴生,上部分离,分离部分仅下部密被黄褐色星状短柔毛;花柱长约10毫米,柱头头状。果实近球形,直径约2.5厘米,顶端具短喙,密被灰色紧贴鳞片状毛和金黄色疏散星状短柔毛,干时表面具不规则皱纹;种子1颗,浅棕色,无毛。花期4—5月,果期8—9月。

产广西(龙州、防城、临桂)、云南(屏边)。生于海拔500—1500米河谷密林中。越南也有。模式标本采自越南。

本种叶下面密被紧贴鳞片状毛。花冠管较长,这是和本属国产其他种区别的主要特征。

20. 灰叶安息香(新拟) 灰叶野茉莉(中国高等植物图鉴),毛垂珠花(中国经济植物志),变秃安息香(广西) 图版 36:7—11

Styrax calvescens Perk. in Engler, Pflanzenr. 30 (IV-241): 32. 1907; Rehd. in Sargent, Pl. Wils. 1: 290. 1912; 中国高等植物图鉴 3:339. 1974——*Styrax dasyantha*



1—6. 银叶安息香 *Styrox argentifolius* Li.: 1. 花枝, 2. 花, 3. 花冠展开示雄蕊, 4. 雄蕊腹、背面观, 5. 子房纵切面, 6. 果实。 7—11. 灰叶安息香 *Styrox calvescens* Perk.: 7. 花枝, 8. 花, 9. 雄蕊, 10. 果实, 11. 种子。(黄少容绘)