

长约2毫米,被毛较少而呈褐色;花冠裂片卵状披针形,长10—12毫米,宽2—3毫米,外面密被淡黄色星状绒毛,内面无毛,边缘常稍内褶,花蕾时镊合状排列,有些裂片呈稍内向镊合状排列,花冠管长约3毫米;雄蕊较花冠短,花丝扁平,下部联合成管,上部分离,全部被星状柔毛,花药长圆形,长约5毫米,宽与花丝相等;花柱比雄蕊稍长,子房密被白色长柔毛。果实球形,直径约1.8厘米,顶端具短尖头或钝,外面密被灰白色星状绒毛和疏被星状短柔毛,不开裂或从顶端整齐3瓣开裂;种子球形,褐色,稍具皱纹,无毛。花期4—5月,果期9—11月。

产广西(都安、龙州)、云南(景东、金平)。生于海拔300—1200米密林中。模式标本采自广西龙州。

本种为一较速生的树种。

本种与产于东南亚的巴豆叶安息香 *Styrax crotonoides* Clarke 很相似,不同点在于本种花萼钟状,萼齿三角形,长1.5—2毫米;花梗长5—7毫米。

22. 厚叶安息香(海南植物志) 海南野茉莉(中国树木分类学) 图版37:8—13

Styrax hainanensis How, 海南植物志 3:181 (Addenda 576) 1974.——*S. pachyphylla* Merr. et Chun in Sunyatsenia 2(3—4): 302. f. 39. 1935; 陈嵘, 中国树木分类学 998图883.1937. (non Pilger 1901.)

乔木,高8—10米;胸径约8厘米;树皮灰褐色;嫩枝近圆柱形,密被暗褐色或锈色星状短柔毛,以后毛渐脱落。叶互生,厚革质,卵形、宽卵形或宽椭圆形,长7—13厘米,宽4—9厘米,顶端钝渐尖,基部圆形或宽楔形,边近全缘或具不明显锯齿,嫩叶上面密被星状短柔毛,成长后无毛,干时黄褐色,下面密被灰黄色或褐色星状绒毛,侧脉每边5—7条,粗壮,至叶缘弯拱连结,第三级小脉近于平行,上面稍凹入或平坦,下面明显隆起;叶柄长2—3厘米,粗壮,密被褐色星状绒毛。总状花序生于小枝下部叶腋,长3—4厘米,粗壮,有花2至数朵;花序梗和花梗均密被褐色星状短柔毛;花白色,长1.3—1.6厘米;花梗粗壮,长约5毫米;小苞片钻形,长2—3毫米,密被褐色星状柔毛,早落;花萼杯状,高约6毫米,宽约7毫米,顶端截形或稍波状,外面密被褐锈色星状绒毛,内面被白色柔毛;花冠裂片长圆状披针形,长10—12毫米,宽3—4毫米,外面密被灰黄色星状绒毛,内面被白色短绒毛,边缘常稍内褶,花蕾时作镊合状排列;花冠管长约4毫米;雄蕊较花冠短,花丝扁平,下部联合成管,无毛,上部分离,全被白色星状短柔毛,花药长约5毫米,药隔稍突出;花柱较花冠长,有棱,柱头头状,子房密被白色长柔毛。果实近球形或扁球形,直径2—2.2厘米,密被灰黄色星状短柔毛,从顶端向下整齐3瓣开裂;种子1颗,栗褐色,平滑,无毛。花期3—4月,果期8—10月。

产广东海南(崖县、陵水)。生于山地杂木林中。模式标本采自海南崖县。

23. 滇南安息香(新拟) 暹罗安息香(英拉汉植物名称) 图版38:1—3

Styrax benzoinoides Craib in Kew Bull. Misc. Inform. 1912(6): 267. 1912. et in



1—7. 中华安息香 *Styrox chinensis* Hu et S. Y. Liang: 1. 花枝, 2. 花蕾, 3. 花, 4. 雄蕊腹、背面观, 5. 果实开裂, 6. 嫩枝上的叶, 7. 叶背部分示被毛。 8—13. 厚叶安息香 *Styrox hainanensis* How: 8. 花枝, 9. 花, 10. 雄蕊, 11. 雌蕊纵切, 12. 果实, 13. 果实开裂示种子。(黄少容绘)