

1 (4): 296. 1934.

本变种与原变种不同点在于叶缘明显具锯齿,花长达 22 厘米;花萼杯状,长过于宽,高 8—10 毫米,宽 5—6 毫米,顶端明显具锯齿。花期 5 月。

产广东(乳源)。生于山谷林中。模式标本采自广东乳源

28. 垂珠花(中国树木分类学) 小叶硬田螺(浙江) 图版 40:8—11


Styrax dasyanthus Perk. in Engler, Bot. Jahrb. **31**: 485. 1902 et in Engler, Pflanzenr. **30** (IV-241): 31. 1907; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 523. 1904; Rehd. in Sargent, Pl. Wils **1**: 289. 1912; Bean, Trees et Shrubs Brit. Isle **2**: 557. 1925; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **8**: 186. 1927; 裴鉴等,江苏南部种子植物手册 579.1959; 中国高等植物图鉴 **3**:339.1974; S. M. Hwang in Acta Phytotax. Sin. **18**(2): 163. 1980.——*S. argyi* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **11**: 64. 1912; Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 407. 1915; W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. **12**: 237. 1920; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **15**: 295. 1934 et **18**: 233. 1937; Lauener in Not. Bot. Gard. Ebinb. **35** (2): 276. 1977.——*S. rubifolia* Guill. in Bull. Soc. Bot. France **70**: 884. 1923.

乔木,高 3—20 米,胸径达 24 厘米;树皮暗灰色或灰褐色;嫩枝圆柱形,密被灰黄色星状微柔毛,成长后无毛,紫红色。叶革质或近革质,倒卵形、倒卵状椭圆形或椭圆形,长 7—14(—16) 厘米,宽 3.5—6.5(—8) 厘米,顶端急尖或钝渐尖,尖头常稍弯,基部楔形或宽楔形,边缘上部有稍内弯角质细锯齿,两面疏被星状柔毛,以后渐脱落而仅叶脉上被毛,侧脉每边 5—7 条,常近基部两条相距较近,上面平坦,下面凸起,第三级小脉网状,两面均明显隆起;叶柄长 3—7 毫米,上面具沟槽,密被星状短柔毛。圆锥花序或总状花序顶生或腋生,具多花,长 4—8 厘米,下部常 2 至多花聚生叶腋;花序梗和花梗均密被灰黄色星状细柔毛;花白色,长 9—16 毫米;花梗长 6—10(—12) 毫米;小苞片钻形,长约 2 毫米,生于花梗近基部,密被星状绒毛和星状长柔毛;花萼杯状,高 4—5 毫米,宽 3—4 毫米,外面密被黄褐色星状绒毛和星状长柔毛,萼齿 5,钻形或三角形;花冠裂片长圆形至长圆状披针形,长 6—8.5 毫米,宽 1.5—2.5(—3) 毫米,外面密被白色星状短柔毛,内面无毛,边缘稍狭内褶或有时重叠覆盖,花蕾时作镊合状排列或稍内向覆瓦状排列,花冠管长 2.5—3 毫米,无毛;花丝扁平,下部联合成管,上部分离,分离部分的下部密被白色长柔毛,花药长圆形,长 4—5 毫米;花柱较花冠长,无毛。果实卵形或球形,长 9—13 毫米,直径 5—7 毫米,顶端具短尖头,密被灰黄色星状短绒毛,平滑或稍具皱纹,果皮厚不及 1 毫米;种子褐色,平滑。花期 3—5 月,果期 9—12 月。

产山东、河南、安徽、江苏、浙江、湖南、江西、湖北、四川、贵州、福建、广西和云南等省区。生于海拔 100—1700 米的丘陵、山地、山坡及溪边杂木林中。模式标本采自湖北宜昌。

29. 台湾安息香(新拟) 奋起湖野茉莉、乌皮九芎(台湾树木志) 图版 41:1—5

Styrax formosanus Matsum. in Bot. Mag. Tokyo **15**: 75. 1901; Hemsl. in Journ.



1—7. 赛山梅 *Styrox confusus* Hemsl.: 1.花枝, 2.果枝, 3.花, 4.雄蕊, 5.雌蕊, 6.果实开裂, 7.种子。 8—11. 垂珠花 *Styrox dasyanthus* Perk.: 8.花枝, 9.花, 10.果实, 11.种子。(邓晶发绘)